



ژئوشیمی عناصر خاکی نادر در کانسار اسکارن باباعلی (شمال غرب همدان) کلیدی برای تعیین شرایط کانی‌زایی

حسن زمانیان، کیخسرو رادمرد*

گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه لرستان

(دریافت مقاله: ۹۳/۱۰/۲۷، نسخه نهایی: ۹۴/۱/۲۲)

چکیده: کانسار باباعلی در فاصله‌ی ۳۹ کیلومتری شمال غرب همدان قرار دارد. نفوذ توده‌ی سینیتی آلموقلاق به داخل سنگ میزبان دیوریتی باعث تشکیل اسکارن آهن شده است. بررسی‌های ژئوشیمی نشان دهنده‌ی مجموع عناصر خاکی نادر بین ۳۵/۴ ppm تا ۵۶۰ ppm در سنگ‌های سینیتی و دیوریتی بوده و تغییرات آن‌ها در بخش اسکارنی و توده‌ی سینیتی نشان دهنده‌ی خاستگاه مشترک آنهاست. مقادیر محاسبه شده Ce/Eu^* بین ۰/۰۸ تا ۱/۲۴ و در Ce/Ce^* بین ۰/۰۹ تا ۱/۰۹ برای سنگ‌های سینیتی، دیوریتی و آگرواسکارن در تغییر است. رخداد بیهنجاری مثبت و منفی Ce به ترتیب با مقادیر پایین و بالای REE در ترکیب کانی‌ها متناسب است. همبستگی بین Eu و CaO بستگی به مقدار دگرسانی پلازیوکلازها بوده است. بیهنجاری Eu با کاهش شدت دگرسانی کاهش یافته است. مقدار La/Y در نمونه‌ها بین ۰/۳۷ تا ۲/۸۹ است که این نسبت پارامتر مهمی برای تعیین pH محیط تشکیل است. تحرك عناصر خاکی نادر به تغییر pH بستگی دارد، به طور کلی اپیدوت، بیشترین و اکتینولیت و مگنتیت کمترین غنی شدگی از عناصر خاکی نادر را نشان می‌دهند. گرمابها برای تشکیل اپیدوت، ریشه‌ی ماقمایی و برای اکتینولیت و فلوگوپیت ریشه‌ی ماقمایی با مقدار عناصر خاکی نادر کمتر یا دخالت آبهای جوی در تشکیل آنها دارد.

واژه‌های کلیدی: باباعلی؛ آلموقلاق؛ سینیت؛ اسکارن؛ مگنتیت؛ اپیدوت.

آن‌ها در پهنه‌های دگرسانی همراه با تمرکز عناصر در کانی‌های منتخب بررسی شدند. همچنین ارتباط این عناصر با ضریب دگرسانی (A.I) و ضریب (K.I) و pH مشخص شدند تا بتوان با تعیین خاستگاه سیالات کانه‌ساز، در مورد خاستگاه کانسار اظهار نظر کرد. در این مقاله تغییرات عناصر خاکی نادر به همراه تفسیر نتایج در عرض پهنه‌های دگرسانی شده ارائه خواهد شد تا جنبه‌های ناشناخته موثر در ژئوشیمی عناصر خاکی نادر در این کانسار آشکار شوند.

مقدمه

همبافت آلموقلاق در شمال غرب پهنه‌ی سنندج - سیرجان و در ۱۵ کیلومتری شمال غرب همدان بروندز دارد کانسار اسکارن باباعلی در مجاورت توده‌ی باتولیتی آلموقلاق بین طول شرقی ۱۰° ۴۸' تا ۱۵° ۴۸' و عرض شمالی ۳۴° ۴۰' تا ۳۵° در غرب پهنه‌ی سنندج - سیرجان و فاصله ۳۹ کیلومتری شمال غرب همدان قرار گرفته است. سنگ میزبان این کانسار دیوریت است. در این پژوهش پهنه‌های دگرسانی مورد بررسی قرار گرفته و الگوی توزیع عناصر خاکی نادر و رفتار ژئوشیمیایی


*نویسنده مسئول، تلفن: ۰۹۱۴۳۶۱۱۴۰۲، نمبر: ۴۱۳۳۳۵۱۵۲۶ پست الکترونیکی: K_radmard@yahoo.com

توده‌ی نفوذی آلمولاق

سنگ‌های تشکیل دهنده‌ی این توده‌ی نفوذی شامل کوارنزیت و سینوگرانیت هستند که سنگ‌های سینوگرانیتی گستره‌ی گسترده‌ی اری را در بر می‌گیرند. مagma اولیه‌ی تولید کننده این توده در اوخر فاز کوه‌زایی لارامید تشکیل شده است و این توده کنگلومرا پلیوسن را قطع کرده است و هیچ قطعه‌ای از آن در این کنگلومرا مشاهده نمی‌شود؛ بنابراین آخرین مرحله‌ی جایگزینی آن احتمالاً در اوخر پلیوسن صورت گرفته است [۱]. این توده دارای انواع فلدسپات‌ها با همرشدی‌های پرتیتی فراوان و ریزدانه‌ای بوده که حضور این دو نوع بافت همراه هم در سینوگرانیت‌ها، گویای فشار بخار آب کم (کمتر از ۵ کیلوبار) در زمان تبلور فلدسپات‌هاست. این توده‌های نفوذی در نمودار $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{CaO}+\text{Na}_2\text{O}+\text{K}_2\text{O}$ نسبت به $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{Na}_2\text{O}+\text{K}_2\text{O}$ از نظر شاخص آلومین جزء متاآلومین‌ها و براساس نمودار $\text{CaO}-\text{Na}_2\text{O}-\text{K}_2\text{O}$ جزء سری گرانیت‌های نوع I هستند [۳].

زمین‌شناسی

از دیدگاه ساختاری ایران، کانسار آهن با بالعی در پهنه‌ی سنندج - سیرجان واقع شده و از تغییرات آن پیروی می‌کند. واحدهای سنگی اطراف باتولیت آلمولاق شامل سه مجموعه‌ی سری سنقر (Son.Ser) با سن تربیاس-ژوراسیک، شیستهای همدان (Jsh) با سن ژوراسیک و سازند آهکی الیگومیوسن (Om) است (شکل ۱). سری سنقر یک دنباله‌ی آتشفسانی-رسوبی بوده و شامل سری سنقر سری سنقر شامل واحدهای کوارتزیت، متاریولیت، گارتنت - میکاشیست، مرمر خاکستری، آتشفسانی - دگرگونی و مرمر نخودی رنگ است که سهم سنگ‌های آتشفسانی به سنگ‌های رسوبی در انتهای دنباله بیشتر بوده و فازهای دگرشکلی در آن شامل کیمرین پسین [۲] و پاسادنین بوده‌اند. کانسار اسکارن با بالعی با سنگ میزان دیوریت در کنار توده‌ی کوارتز سینیت واقع شده است. به طور کلی واحدهای موجود در معدن با بالعی شامل دو بخش مهم واحدهای آتشفسانی - رسوبی و نفوذی است.



شکل ۱ (الف) موقعیت منطقه‌ی با بالعی در نقشه‌ی ایران. ب) زمین‌شناسی باتولیت آلمولاق. پ) زمین‌شناسی ساده شده معدن با بالعی [۳].


کوارتز سینیت دگرسان شده که اسفن و اپیدوت فراوان به صورت رگهای آن را از پهنه‌ی سینیتی جدا می‌کند. ۳-پهنه‌ی اپیدوت - کوارتز در کنار پهنه‌ی کانی‌سازی اصلی دارای شدت اسکارن بیشتر بوده و با افزایش سریع اپیدوت، کلسیت، مگنتیت مشخص می‌شود. موقعیت پهنه‌های ۲ و ۳، بین پهنه‌های کوارتز سینیت و توده‌ی معدنی در شکل (۳ الف) نشان داده شده‌اند. پهنه‌های ۲ و ۳ با هم تشکیل اندواسکارن را می‌دهند. میزان اپیدوت این پهنه بیشتر از پهنه‌های دیگر است (شکل ۳ ب). ۴- این پهنه بخش اصلی کانه‌زایی مگنتیت را تشکیل می‌دهد و با افزایش شدید آن رگهای تشکیل شده است. تشکیل مگنتیت همراه با کلسیت اسپاری و کوارتز، اکتینولیت، آپاتیت و تورمالین در کنار هم از مشخصات این پهنه است (شکل ۳ ب-ت). ۵- پهنه گارت-پیروکسن که با فراوانی پیروکسن و گارت مشخص شده و کاهش شدید مگنتیت، اکتینولیت و کوارتز نیز در این پهنه دیده می‌شود. ۶- پهنه اکتینولیت-کلسیت-کوارتز-کلریت در نزدیکی توده‌ی دیوریتی قرار گرفته و با افزایش اکتینولیت، کلسیت و کلریت و کاهش اپیدوت و مگنتیت مشخص می‌شود. ۷- پهنه‌ی دیوریت دگرسان که با کاهش اکتینولیت، کلسیت، اپیدوت و افزایش سریسیت و پلازیوکلаз و فلدسپات‌های پتاسیم و کوارتز است. پهنه‌های ۷-۶-۵-۴ با هم تشکیل اگزواسکارن را می‌دهند که گسترش یافته‌تر از اندواسکارن بوده و حدود ۷ برابر آن است (۳۹ متر نسبت به ۵/۵ متر). پهنه‌ی هشتم دیوریت (Di) تغییر شکل یافته با مقدار اندک فلدسپات پتاسیم و مقدار بالای پلازیوکلاز است. دیوریت‌ها در نمودار $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{Na}_2\text{O}+\text{K}_2\text{O}$ از نظر شاخص آلومین جزء متالآلومین‌ها هستند [۳]. بررسی‌های انجام شده نشان داد که از نظر سنی، دیوریت‌ها قدیم‌تر از سینیت آلموقلاق بوده و سن دیوریت 144 ± 7 میلیون سال تعیین شده است [۵]. این دیوریت میزبان اسکارن بوده که به علت دگرشکلی‌ها و نفوذ گرمابها در درز و شکاف‌های خود، اسکارنی شدن شده است.

توده معدنی و اسکارنی

توده‌های نفوذی شامل توده‌های سینوگرانیتی، دیوریت پورفیری و کوارتز سینیت است. مشخصات کوارتز سینیت و سینوگرانیت همبافت آلموقلاق در جدول ۱ آورده شده‌اند. دیوریت‌ها در مقایسه با میانگین دیوریت‌ها [۳] از نظر مقدار FeO و MgO فقر و از نظر مقدار Na_2O و Al_2O_3 غنی و از $\text{Si}_2\text{O}_5\text{CaO}$ و K_2O مشابه آنها هستند. توده‌های معدنی منطقه‌ی بابا علی از تعدادی عدسی‌های کوچک و بزرگ سنگ آهن به فاصله‌های مختلف از یکدیگر تشکیل شده‌اند. توده‌ی معدنی اصلی در مرکز (به درازای ۲۵۰ متر و پهنای ۴۰ تا ۴۵ متر) و توده‌های کوچکتر تقریباً در بخش جنوب غربی گستره و نزدیک به توده‌ی اصلی و شمال منطقه‌ی (با راستای شمالی - جنوبی) قرار دارند. کانی‌های مشاهده شده به ترتیب فراوانی عبارتند از منیتیت، هماتیت، لیمونیت، مالاکیت، پیریت و کالکوپیریت هستند. کانی‌های باطله شامل اپیدوت، اکتینولیت، کلریت، کوارتز و کلسیت، و در یک رده‌بندی کلی از دو گروه بافت اولیه و ثانویه تشکیل شده‌اند. در شکل ۱ زمین‌شناسی باтолیت آلموقلاق به همراه نقشه‌ی زمین‌شناسی ساده شده معدن بابا علی آورده‌اند (شکل ۱ ب-پ). از جنوب شرق به سمت شمال غرب، هشت پهنه در این کانسار تشخیص داده شده‌اند. در شکل ۲ پهنه بندی معدن بابا علی و ارتباط جانبی توده‌های نفوذی سینیتی و دیوریتی همرا با کانی‌های خاص هر پهنه و موقعیت اندواسکارن و اگزواسکارن آورده شده‌اند. نتایج بررسی‌های میکروسکوپی و نوع کانی‌های هر پهنه به شرح زیراند: پس از توده‌ی سینیتی اندواسکارن و اگزو اسکارن قرار گرفته و پس از اگزواسکارن توده‌ی دیوریتی دیده می‌شود که با ۲۷ متر پهنا در داخل اگزواسکارن قرار گرفته شده است. ۸- پهنه‌ی اصلی به ترتیب از توده‌ی نفوذی به سمت سنگ میزبان دیوریتی تشخیص داده شدند [۴]، که عبارتند از: ۱-پهنه‌ی کوارتز سینیت (Sy) که شامل سنگ‌های سینیتی آلموقلاق بوده و در اثر تاثیر این توده‌ی نفوذی و سیالات همراه آن، اسکارن و توده‌ی معدنی همراه آن تشکیل شده‌اند (جدول ۱). ۲- پهنه‌ی

جدول ۱ ترکیب مدار سنگ های زون اول.

کانی	گروه کوارتز سینیت					گروه سی ینو گرانیت	
	الکالی سینیت	کوارتز سینیت	کوارتز مونزونیت	کوارتز الکالی سینیت	مونزو گرانیت	الکالی سی ینو گرانیت	سی ینو گرانیت
پلاژیوکلار	۳	۹,۵-۱۴	۲۵-۳۰	۲	۳۰	۴	۷
فلدسبار پاتاسیم دار	۸۹	۳۹,۵-۵۱	۳۴,۵-۴۵	۶۷	۲۹	۵۴	۵۲,۵
کوارتز	۳	۹-۱۰	۱۰-۱۵	۱۳	۱۹	۲۰	۲۵
هورنبلند	-	۲۰-۲۷	۲۵-۲۵	۱۴/۷۵	-	-	۱۰
کلریت	-	-	۲,۸-۵	۲	۶	-	۱
کلسیت	-	-	۰,۲-۲	-	-	-	-
بیوتیت	-	-	۰-۲,۵	-	-	-	-
تورمالین	-	-	-	-	۸	-	-
تیتانیت	۲,۵	۲,۵-۵	۱,۵-۴	-	-	۳	۳
مسکویت	۰,۵	۰-۰,۵	۰-۰,۵	-	۸	۱۶	-
اپیدوت	۰	۰-۲,۵	۰-۲	-	-	-	۱,۵
مگنتیت	۲	۰-۴	۰-۱	۲	۱,۵	۳	۰,۵
کل	۱۰۰	-	-	۱۰۰,۷۵	۱۰۱,۵	۱۰۰	۱۰۰



شکل ۲ پهنه‌بندی معدن و موقعیت اندواسکارن و اگزاوسکارن [۴].



شکل ۳ (الف) محل پهنه‌های کوارتز سینیت آلتره شده و اپیدوت کوارتز سینیت (ب) اپیدوت جانشین شده با مگنتیت در پهنه‌ی ۳. (پ) جانشینی کلسیت به وسیله‌ی مگنتیت. ت) جانشینی تورمالین به وسیله‌ی مگنتیت در پهنه‌ی ۴.

عناصر خاکی نادر به طور گستردگی به عنوان ابزاری برای

تفسیر فرایندهای ژئوشیمیایی به کار می‌رود.

بررسی رفتار ژئوشیمیایی عناصر خاکی نادر کاربردهای مهمی در تفسیر رخدادهای زمین شناسی دارد. این گروه از عناصر به سه دسته عناصر نادر سبک (LREE) و سنگین (HREE) و اعضای میانی (MREE) رده بندی شده‌اند [۷]. بررسی عناصر

ژئوشیمی عناصر خاکی نادر

رفتار مشابه ژئوشیمیایی عناصر خاکی نادر طی فرایندهای زمین‌شناسی ناشی از خواص مشابه شیمیایی و فیزیکی آنهاست [۶]. با وجود این شباهت‌ها به دلیل قابلیت جدایش عناصر خاکی نادر طی فرایندهای ژئوشیمیایی، مقادیر بهنجار شده

ی دیوریتی بررسی شدند. برای جدایش بهتر عناصر خاکی نادر، نمودارهای تمرکز عناصر سبک (LREEs; La-Nb)، میانی (HREEs; Er-Lu) و سنگین (MREEs; Sm-Ho) نسبت به پهنه‌ها در شکل ۵ آورده شده‌اند. نکات مهمی که از این نمودارها می‌توان برداشت کرد شامل موارد زیراند: ۱- الگوی توزیع HREEs، MREEs، LREEs، آن‌ها در پهنه‌های اگزواسکارنی و تهی‌شدگی شدید آن‌ها در پهنه‌ی معدنی است. ۲- الگوی عناصر در پهنه‌ی اگزواسکارنی را به دو بخش می‌توان رده‌بندی کرد که مقدار این عناصر در پهنه اگزواسکارنی با دور شدن از توده‌ی نفوذی کمتر می‌شود. برای تفسیر بهتر علت این عوامل مقدار La/Y در نمونه‌ها محاسبه شد که پارامتر مهمی برای تعیین pH محیط تشکیل است که مقدار کمتر از ۱ نشان دهنده‌ی محیط اسیدی و بیشتر از یک نشان دهنده‌ی محیط بازی است [۱۰]. این نسبت در پهنه‌های بررسی شده بین ۰,۳۷ تا ۰,۸۹ در تغییر است. بیشترین مقدار این نسبت در پهنه‌ی معدنی دیده می‌شود. در نمودار Y/La نیز مانند نمودارهای توزیع عناصر خاکی نادر، دو بخش مختلف در پهنه‌ی اگزواسکارنی مشاهده شدند و در نزدیک توده‌ی نفوذی شرایط بازی بوده و با دور شدن از توده‌ی نفوذی شرایط اسیدی می‌شود (شکل ۶ الف). عناصر خاکی نادر به طور مستقیم یا غیر مستقیم با pH و شرایط اکسایش و کاهش کنترل می‌شوند [۱۱] و با توجه به اینکه در شرایط اسیدی REE‌ها شسته شده و در شرایط بازی تهیشیان می‌شوند، نمودار مقدار عناصر خاکی نادر در پهنه‌ها با نمودار La/Y همبستگی خوبی در پهنه‌ی اگزواسکارنی نشان می‌دهد. وجود مغایرت در پهنه‌ی معدنی که با وجود دارا بودن بالاترین شرایط بازی دارای کمترین تمرکز عناصر خاکی نادر است، به علت نوع کانی‌های موجود این پهنه بوده که توانایی نگهداشتن REE را در ساختار خود نداشته و یا جذب این عناصر قبل از رسیدن آن‌ها به پهنه معدنی یا برداشت نمونه فقط از سنگ‌های مگنتیتی باشد. میزان پایین عناصر خاکی نادر در نمونه A12 (پهنه‌ی معدنی)، به علت جذب به وسیله اپیدوت در پهنه‌ی اپیدوت-کوارتز است که باعث تمرکز عناصر خاکی نادر از گرمابی‌های مشتق شده از توده‌ی سینیتی پیش از ورود آن‌ها به پهنه توده معدنی شده است. مگنتیت‌های خالص برخلاف آپاتیت و تیتانو مگنتیت به علت شعاع یونی عناصر تشکیل دهنده‌ی آن، تمرکز دهنده‌ی

خاکی نادر در سنگ‌ها و کانی‌ها طی سال‌های گذشته به دلایل زیر توجه ویژه‌ای را به خود جلب کرده است، نخست به علت رفتار آن‌ها در فرایندهای گوناگون ژئوشیمیایی باعث شده که به عنوان ردياب در محیط‌های زمین شناسی استفاده شوند و از طریق آن‌ها می‌توان به خاستگاه کانی‌ها و سنگ‌ها و جایگاه‌های زمین‌ساختی و زمین شناسی پی برداشت، دوم مسائل زیست محیطی REE در پساب‌های رادیواکتیو بسیار مهم و REE‌ها به عنوان محصولات شکافت پلوتونیم و اورانیم در نیروگاه‌های هسته‌ای شناخته می‌شوند [۸]. سوم، از نظر اقتصادی کاربردهای گوناگون و ارزش فوق العاده دارند. درجه‌ی تفکیک عناصر خاکی نادر را می‌توان از روی نسبت غلظت عناصر خاکی نادر سبک به سنگین به دست آورد. از ویژگی‌های مهم عناصر REE جایگزینی راحت آن‌ها با کلسیم است که به علت هم‌ریخت بودن آن‌ها با کلسیم است [۹].

روش بررسی

برای بررسی عناصر REE، نمونه‌های انتخاب شده از بررسی‌های صحرایی برای تجزیه به آزمایشگاه ALSChemex کانادا ارسال شدند. تعداد ۱۵ نمونه از بخش‌های مختلف معدن به روش XRF در آزمایشگاه دانشگاه تربیت مدرس تجزیه شدند. برای بررسی‌های میکروسکوپی ۴۰ مقطع نازک و ۱۵ مقطع صیقلی تهیه و مورد بررسی قرار گرفتند. در جدول ۲ موقعیت نمونه‌های برداشتی و نتایج تجزیه در جدول‌های ۳ تا ۶ آورده شده‌اند. نمونه برداری از پهنه‌ی شماره ۸ به سمت پهنه‌ی شماره ۱ انجام شده است.

بحث: تحرک، توزیع و جدایش عناصر خاکی نادر

الگوی پراکندگی عناصر خاکی نادر برای سه بخش از سنگ‌های دیوریتی، اگزواسکارنی و توده‌ی سینیتی در شکل ۴ نشان داده شده‌اند. چنانکه در شکل دیده می‌شود، الگوی پراکندگی نشان دهنده‌ی غنی شدگی این عناصر در اگزواسکارن و توده‌ی دیوریتی و سینیتی در منطقه‌ی باطنی است. بیشترین مقدار غنی شدگی REE در پهنه‌ی اگزواسکارنی و کمترین آن در پهنه‌ی ۴ مشاهده می‌شود. پهنه‌های ۱ تا ۳ تشکیل پهنه‌ی سینیتی، پهنه ۴ به خاطر داشتن مگنتیت بیشتر نسبت به سایر پهنه‌ها جدا از اگزواسکارن در نظر گرفته شده‌اند پهنه‌های ۵ تا ۷ تشکیل پهنه‌ی اگزواسکارنی را داده و پهنه ۸ به عنوان پهنه-

گستره‌ی بین ۱۱۱ تا ۵۶۰ ppm است. نتیجه بررسی‌ها در کانسارهای آهن ناحیه‌ی بربیگ سالگن، بین سوئد و آلمان، نشان داد که کانسارهای اسکارنی می‌توانند الگوهای متفاوتی از غنی‌شدگی یا تهی‌شدگی از عناصر REE سیک یا سنگین و یا بیهنجاری Eu مثبت یا منفی را نشان دهند [۱۷]. عناصر خاکی نادر به طور کلی می‌توانند در آپاتیتها جمع شوند و به همین خاطر این عناصر ارتباط نزدیکی با مقدار فسفر دارند و در این کانسار نیز همبستگی مثبتی بین عناصر خاکی نادر با P_2O_5 در منطقه اسکارنی (خارج از پهنه‌ی معدنی) دیده می‌شود (شکل ۶ ب). برای بهتر نمایان شدن همبستگی‌ها می‌توان اعداد را در یک ضریب ثابت ضرب یا تقسیم کرد.

بیهنجاری Eu و Ce و عوامل تاثیرگذار

نسبت^{*} Eu/Eu و Ce/Ce^{*} که بنا بر معادلات:

$$Eu/Eu^* = \left\{ \frac{(2Eu)_{sp}}{Eu_{(chon)}} \right\} / \left\{ \frac{(Sm)_{sp}}{Sm_{(chon)}} \right\} + \left\{ \frac{(Gd)_{sp}}{Gd_{(chon)}} \right\}$$


$$Ce/Ce^* = \left\{ \frac{(2Ce)_{sp}}{Ce_{(chon)}} \right\} / \left\{ \frac{(La)_{sp}}{La_{(chon)}} \right\} + \left\{ \frac{(Pr)_{sp}}{Pr_{(chon)}} \right\}$$

محاسبه می‌شود مقیاسی از بیهنجاری بوده و مقادیر بالاتر از ۱ بیهنجاری مثبت و مقادیر کمتر از ۱ نشان دهنده بیهنجاری منفی است. مقادیر محاسبه شده برای Eu/Eu^{*} بین ۰,۲۹ تا ۱,۲۴ و Ce/Ce^{*} بین ۰,۸ تا ۱,۰۹ در تغییر است. نمودار Ce/Ce^{*} و Eu/Eu^{*} در هر پهنه در شکل ۶ الف آورده شده است. مقادیر Ce/Ce^{*} در پهنه‌ی اگزواسکارنی را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد که بخش نزدیک توده‌ی معدنی دارای مقادیر کمتر از ۱ و بخش دورتر از توده‌ی اگزواسکارنی، در پهنه‌ی اگزواسکارنی، عناصر خاکی نادر شسته شده و مقدار این عناصر کمتر است و مقادیر آن‌ها بین ۱۱۰,۵۵ تا ۲۰۷,۵۸ ppm متغیر است. در بخش بازی پهنه‌ی اگزواسکارنی مقادیر REE بین ۴۰۷,۳۳ تا ۵۵۹,۵۷ ppm تغییر می‌کند. این ارتباط بین Ce و REE بیان کننده‌ی ثابت شدن Ce به صورت Ce^{+4} در شرایط اکسیدی و اسیدی است، در حالی که در شرایط بازی عنصر Ce با لیگاندهای کربنات، تشکیل همبافت داده و از گستره شسته شده و حرکت داده می‌شود که باعث بیهنجاری منفی Ce می‌گردد [۱۸]. رفتار Eu در نمونه‌ها قابل توجه است


مناسبي برای REE نیست [۱۲]. در این کانسار تجزیه‌ی شیمیایی مگنتیت به روش EMPA نشان دهنده‌ی آن است که مگنتیت یک فاز خالص است، لذا مقدار کل پایین عناصر خاکی نادر در پهنه‌ی چهارم (نمونه‌ی A12) می‌تواند به خاطر خالص بودن مگنتیت‌ها و برداشت نمونه از مگنتیت‌ها نیز باشد. درجه‌ی جدایش LREE نسبت به HREE را می‌توان از روی (La/Yb)_n (La/Sm)_n, (Gd/Yb)_n یا (La/Lu)_n محاسبه کرد. نسبت (La/Yb)_n برای درجه‌ی جدایش عناصر خاکی نادر سبک از سنگین در فرایندهای ژوژیمیایی به کار می‌رود [۱۴, ۱۳]. مقدار این نسبتها برای (La/Yb)_n ۲/۷۷ تا (La/Sm)_n ۳۲/۵۷ و برای (Gd/Yb)_n از ۰,۸۴ تا ۳۰,۶ و برای (La/Sm)_n از ۱/۵۲ تا ۹,۹۶ تغییر می‌کند. این نسبتها نشان دهنده جدایش به صورت زیر بوده LREE/HREE>LREE/MREE>MREE/HREE و نمایانگر تفرقه بیشتر عناصر سبک از عناصر سنگین و نیز MREE/HREE و LREE/MREE جدایی نسبتاً ضعیف است. الگوی توزیع مقادیر بیهنجار شده عناصر خاکی نادر نسبت به کندریت‌ها نیز تایید کننده نسبتها بالاست (شکل ۴). بالاترین مقادیر هر سه نسبت در پهنه‌ی معدنی مشاهده می‌شوند (جدول ۴) که نشان دهنده‌ی جدایش شدید این عناصر در پهنه‌ی معدنی است و به علت پایین بودن HREE یا بالا بودن LREE است. همبافت‌های فلوریدی برای حمل عناصر خاکی نادر سنگین و همبافت‌های کلریدی برای حمل عناصر خاکی نادر سبک مهم‌ترند [۱۵] لذا به احتمال زیاد مقدار پایین عناصر خاکی نادر در مگنتیت این پهنه، به علت حمل عناصر خاکی نادر به وسیله‌ی اپیدوت پیش از رسیدن به این پهنه یا جذب به وسیله‌ی آپاتیت موجود در این پهنه است. تشابه میزان عناصر خاکی نادر و الگوی آن‌ها می‌تواند نشان دهنده‌ی وجود یک خاستگاه مشترک برای آن‌ها باشد [۱۶]. شباهت الگوی عناصر خاکی نادر در اگزواسکارن و توده‌ی دیوریتی و سینیتی مشابه بوده و نشان دهنده‌ی تحت تاثیر قرار گرفتن هر سه منطقه به وسیله‌ی گرمای‌ها بوده است که خاستگاه آن از توده‌ی سینیتی است، و توده‌ی دیوریتی فقط نقش سنگ میزان را بازی کرده است. با توجه به جدول ۳ و ۴ میزان فراوانی مطلق عناصر خاکی نادر مشابه بوده و بدون در نظر گرفتن نمونه‌ی A12 در

جدول ۲ موقعیت نمونه برداری و بخش‌های مختلف معدن و توده معدنی.


موقعیت نمونه	توده دیوریتی	اسکارن	توده معدنی	توده سینیتی
شماره نمونه	A1-A2	A3-A4-A5-A6-A7 A8-A9-A10-A11	A12	A13-A14-A15



شکل ۴ فراوانی عناصر خاکی نادر در نمونه‌های اگزوسکارنی، سینیتی، دیوریتی و منطقه‌ی معدنی بهنجار شده با کندیتیها [۶].



شکل ۵ (الف) نمودار تمرکز عناصر خاکی نادر سبک (LREEs La-Nb) در تمام نمونه‌های پهنه‌های اسکارن با باعثی. (ب) نمودار تمرکز عناصر خاکی نادر میانی (MREEsSm-Ho) و سنگین (HREEs Er-Lu) در تمام نمونه‌های پهنه‌های اسکارن با باعثی.



شکل ۶ (الف) نمودار Eu/Eu*-Ce/Ce*-La/Y در تمام نمونه‌های پهنه‌های اسکارن با باعثی. (ب) همبستگی بین عناصر خاکی نادر با

جدول ۳ نتایج آنالیز ICP-MS و میزان عناصر خاکی نادر در نمونه‌های A1-A15

sample REE(ppm)	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15
La	۲۸,۲	۴۸,۳	۱۲,۹	۲۴,۶	۱۷,۶	۲۵,۵	۳۶,۹	۳۱,۴	۱۵۵	۱۱۶	۱۳۶	۱۰,۴	۳۹,۲	۸۶,۷	۴۳,۲
Ce	۷۶,۲	۷۳,۱	۳۸,۵	۶۷,۹	۴۹,۸	۵۳,۸	۷۶,۳	۷۸,۷	۲۳۳	۱۶۸	۲۰۲	۱۶,۶	۸۱,۳	۱۳۶	۹۴,۶
Pr	۸,۸۱	۷,۳۴	۵,۳۵	۹,۱۳	۶,۴۲	۶,۴۲	۸,۸۸	۹,۷۸	۲۲,۳	۱۵,۸	۱۹	۱,۲۹	۹,۱۴	۱۲,۳	۱۱
Nd	۲۵,۲	۲۷,۸	۲۳,۹	۳۸,۹	۲۷,۳	۲۷,۱	۳۴,۹	۳۹,۴	۷۶,۱	۵۴,۴	۶۴	۴,۵	۳۵,۷	۳۹	۴۳
Sm	۷,۲۹	۶,۷۹	۵,۴۴	۸,۳۱	۶,۲۳	۶,۷	۷,۵۵	۸,۸۸	۱۴,۱	۱۰,۴	۱۱,۳	۰,۶۷	۷,۵۶	۷,۴	۹,۴۴
Eu	۱,۹۸	۲,۹۲	۲,۱۲	۲,۹۵	۲,۲۸	۲,۱۶	۲,۰۸	۲,۱۲	۴,۲۲	۴,۵۶	۳,۴۶	۰,۰۷	۲,۳۲	۲,۸۴	۲,۰۶
Gd	۷,۳۹	۷,۶۲	۵,۶۲	۸,۲	۶,۱۲	۶,۶۴	۷,۷۳	۸,۸۵	۱۵,۱	۱۱,۲	۱۱,۹	۰,۸۳	۷,۴۵	۷,۸۶	۹,۳۷
Tb	۱,۲۸	۱,۴۸	۱,۰۳	۱,۴۲	۱,۰۶	۱,۲	۱,۳۸	۱,۶۶	۲,۴۵	۱,۷۶	۱,۸۹	۰,۰۱	۱,۳۲	۱,۲۵	۱,۷۱
Dy	۷,۹۶	۹,۹	۶,۴۸	۸,۲۶	۶,۶۶	۷,۲۶	۸,۴۸	۱۰,۵	۱۴,۸	۱۰,۶	۱۰,۹	۰,۵۴	۷,۸۹	۷,۰۷	۱۰,۶
Ho	۱,۶۶	۲,۲۴	۱,۲۹	۱,۶۱	۱,۳۱	۱,۵۶	۱,۷۶	۲,۱۳	۳,۱۵	۲,۲	۲,۲۷	۰,۰۲	۱,۵۵	۱,۳۷	۲,۲۳
Er	۴,۹۱	۶,۸۴	۳,۶۹	۴,۶۳	۳,۷۶	۴,۲۶	۵,۲۵	۶,۳	۹,۱۶	۶,۲۶	۵,۵۷	۰,۲۳	۴,۶۳	۳,۹۶	۶,۵۷
Tm	۰,۷۶	۱,۱۵	۰,۵۵	۰,۶۷	۰,۵۷	۰,۶۳	۰,۸۳	۱	۱,۳۷	۰,۹۵	۰,۹۴	۰,۰۲	۰,۷	۰,۵۶	۱,۰۹
Yb	۴,۶۴	۷,۳۸	۳,۲۱	۳,۷۶	۳,۳۴	۳,۷۸	۴,۸	۵,۹۶	۸,۱۲	۵,۴۳	۵,۸۸	۰,۲۲	۴,۴۲	۳,۴۵	۶,۲۱
Lu	۰,۷	۱,۱۷	۰,۴۷	۰,۵۴	۰,۴۷	۰,۵۲	۰,۷۳	۰,۹	۱,۲۵	۰,۸۲	۰,۸۸	۰,۰۱	۰,۶۴	۰,۴۷	۰,۹۶
Y	۴۵,۲	۶۳,۱	۳۴,۶	۴۰,۸	۳۵,۱	۴۰	۴۷,۵	۵۶,۴	۸۱,۵	۵۷,۴	۵۹,۷	۳,۶	۴۲,۷	۳۸,۹	۵۹,۲

جدول ۴ مقادیر محاسبه شده برای عناصر خاکی نادر در نمونه‌های A1-A15

sample REE	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15
LREELa-Nd(ppm)	۱۵۸,۴۱	۱۵۸,۵۴	۸۰,۶۵	۱۴۰,۵۳	۱۰,۱,۱۲	۱۱۲,۸۲	۱۵۶,۹۸	۱۵۹,۲۸	۴۸۵,۹۰	۲۵۳,۳۰	۴۲۰,۵۰	۳۲,۷۹	۱۶۵,۳۴	۲۷۳,۵۰	۱۹۱,۷۵
MREESm-Ho(ppm)	۲۷,۵۶	۳۰,۹۵	۲۱,۹۸	۳۰,۷۵	۲۳,۶۶	۲۵,۰۲	۲۸,۹۸	۳۴,۱۴	۵۳,۷۷	۴۰,۵۷	۴۱,۶۲	۲,۱۴	۲۸,۰۹	۲۷,۵۹	۳۵,۴۱
HREEEr-Lu(ppm)	۱۱,۰۱	۱۶,۵۴	۷,۹۲	۹,۶۰	۸,۱۴	۹,۱۹	۱۱,۶۱	۱۴,۱۶	۱۹,۹۰	۱۲,۴۶	۱۳,۲۷	۰,۴۸	۱۰,۳۹	۸,۴۴	۱۴,۸۳
□REE(La-Lu)(ppm)	۱۹۷	۲۰,۴	۱۱۱	۱۸۱	۱۳۳	۱۴۸	۱۹۸	۲۰۸	۵۶۰	۴,۰۷	۴۷۵	۲۵,۴	۲۰,۴	۲۱,۰	۲۴۲
(La/Lu)n	۵,۷۸	۴,۳۷	۲,۹۰	۴,۸۲	۳,۹۶	۵,۱۹	۵,۳۵	۳,۶۹	۱۲,۰۸	۱۴,۹۱	۱۶,۳۰	۲۲,۰,۱۳	۶,۴۸	۱۹,۵۵	۴,۷۶
La/Y	۰,۸۵	۰,۷۷	۰,۳۷	۰,۶۰	۰,۵۰	۰,۶۴	۰,۷۸	۰,۵۶	۱,۹۰	۲,۰۱	۲,۲۷	۲,۸۹	۰,۹۲	۲,۲۳	۰,۷۳
Eu/Eu*	۰,۸۲	۱,۲۴	۱,۱۷	۱,۰۹	۱,۱۳	۰,۹۹	۰,۸۳	۰,۷۳	۰,۸۸	۱,۳	۰,۹۱	۰,۲۹	۰,۹۴	۱,۰۶	۰,۶۷
Ce/Ce*	۰,۹۳	۰,۸۱	۱,۰۷	۱,۰۵	۱,۰۹	۰,۹۶	۰,۹۵	۱,۰۴	۰,۸۲	۰,۸۰	۰,۸۲	۰,۹۱	۰,۹۷	۰,۸۶	۰,۹۹
(La/Sm)n	۳,۳۶	۴,۰۶	۱,۰۲	۱,۹۰	۱,۸۱	۲,۴۴	۳,۱۴	۲,۲۷	۷,۰۳	۷,۱۶	۷,۶۹	۹,۹۶	۳,۳۳	۷,۵۲	۲,۹۴
(La/Yb)n	۵,۶۷	۴,۰۱	۲,۷۷	۴,۰۱	۳,۶۳	۴,۶۵	۵,۳۰	۳,۶۳	۱۳,۱۱	۱۴,۶۵	۱۵,۸۷	۳۲,۵۷	۶,۱۱	۱۷,۳۱	۴,۷۹
(Gd/Yb)n	۱,۲۹	۰,۸۴	۱,۴۲	۱,۷۷	۱,۴۹	۱,۴۲	۱,۳۱	۱,۲۰	۱,۵۱	۱,۶۶	۱,۶۳	۲,۰۶	۱,۳۷	۱,۸۵	۱,۲۲
(Pr/Yb)n	۳,۴۴	۱,۸۰	۲,۰۲	۴,۴۰	۳,۴۸	۳,۰۷	۳,۳۵	۲,۹۷	۴,۹۷	۵,۲۷	۵,۸۵	۱,۰۶۱	۳,۷۴	۶,۴۵	۳,۱۹
A.I	۱۹,۲۳	۶,۰۶	۲۹,۶۰	۲۹,۶۳	۳۱,۶۹	۲۲,۰۹	۲۳,۳۵	۲۸,۲۳	۲۱,۷۶	۲۰,۹۷	۲۲,۶۳	۱,۴۵	۱۸,۷۱	۲۴,۳۵	۳۶,۸۴
K.I	۸,۰۰	۰,۱۲	۶,۰۷	۵,۰۸	۴,۹۲	۶,۴۳	۸,۷۰	۹,۲۳	۵,۶۱	۲,۲۳	۷,۳۱	۱,۴۵	۱,۹۲	۲,۰۴	۲۶,۵۷


اکسیدی بودن آن می‌توان عدم بیهنجاری مثبت Eu را به شرایط اکسیدی کانسار در زمان تشکیل نسبت داد. وجود کانی پتسالیت نیز به عنوان یک کانی شاخص شرایط اکسایشی، تایید کنندهٔ شرایط تشکیل اکسیدی کانسار است [۳]. بیهنجاری مثبت Eu در نمونه‌های A2-A3-A4-A5-A10 با میزان پلازیوکلاز و فلدسپات در این نمونه‌ها وابسته بود و با شواهد میکروسکوپی نیز تایید شده است. بیشترین مقدار بیهنجاری منفی وابسته به نمونه A12 برداشت شده از منطقهٔ کانه است که به علت عدم دگرسانی است (جدول ۴). با توجه به تغییر سیستماتیک ترکیبات شیمیایی تشکیل دهندهٔ سنگ‌ها شامل K_2O ، Na_2O ، CaO و MgO با فاصله از تودهٔ معدنی، استفاده از این ترکیب‌های می‌تواند به عنوان شاخص‌های ژئوشیمیایی مفید در پی‌جوبی به کار برده شود و پیش از کاربرد روش‌های تجزیه‌ای پر هزینه برای تجزیهٔ عناصر خاکی نادر از روش‌های آسانتر و ارزان‌تر برای پی‌جوبی‌های مقدماتی و تجزیه استفاده کرد. این شاخص‌ها را می‌توان به صورت زیر به کار برد.

$$K.I = K_2O / (Na_2O + K_2O + CaO + MgO) \times 100$$

$$A.I = (MgO + K_2O) / (Na_2O + K_2O + CaO + MgO) \times 100$$

[۲۳-۲۲]

که هم دارای بیهنجاری‌های مثبت و هم منفی است. با توجه به اینکه حمل کننده‌های Eu پلازیوکلازها هستند، این تغییرات ممکن است با درجهٔ تجزیه پلازیوکلازها در ارتباط باشد و بیهنجاری مثبت Eu با مرحلهٔ اولیه دگرسانی سنگ‌ها در شرایط اسیدی سازگار است [۱۹] بیهنجاری مثبت Eu (La/Lu)n بیشتر از یک می‌تواند نشان دهندهٔ سیالات با ماهیت اسیدی و دمای بالا باشد [۲۰]. با بهره‌گیری از سه پارامتر $(Pr/Yb)_{cn}$ -Ce/Ce*-Eu/Eu*(Pr/Yb)_{cn}-Ce/Ce*-Eu/Eu با نمونه‌های وابسته به منطقهٔ اگزواسکارنی (شکل ۷ الف تا پ)، می‌توان به این نتیجه رسید که سیالات موثر در کانه‌زایی حداقل شامل دو نوع سیال متفاوت بوده که یک نوع دارای عناصر خاکی نادر بیشتر نسبت به سنگ میزبان دیوریتی بوده و نوع دوم نسبت به آن دارای عناصر خاکی نادر کمتری است. فلدسپات‌ها نسبت به دیگر کانی‌ها دارای مقادیر Eu بالایی هستند که نشان دهندهٔ ضریب توزیع بالای آن در میان فلدسپات‌ها است [۲۱] زیرا Eu در فلدسپات‌ها عنصری سازگار به حساب می‌آید بنابراین خارج شدن فلدسپات از یک گدازه می‌تواند باعث بیهنجاری منفی Eu در گدازه باقیمانده شود. فعالیت پایین اکسیژن (شرایط احیایی) می‌تواند ضریب توزیع Eu را بالا برده و باعث بیهنجاری مثبت Eu شود [۶]، با توجه به تشکیل این کانسار در عمق کم و



شکل ۷ الف تا پ: نمودارهای نشان دهنده نوع سیالات موثر در کانی‌سازی در اگزواسکارن در مقایسه با دیوریت میزبان که با توجه به پراکندگی نقاط به دو بخش می‌توان تقسیم کرد. د. ن) همبستگی بین $(Eu/Eu)_{cn}$ - CaO در اگزواسکارن.

جدول ۴ مقادیر محاسبه شده برای عناصر خاکی نادر در نمونه های A1-A15

sample \ REE	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15
LREELa-Nd(ppm)	158,41	156,54	18,05	140,53	10,1,12	112,82	156,98	159,28	480,90	253,30	420,50	22,79	165,34	273,50	191,75
MREESm-Ho(ppm)	27,06	30,95	21,98	30,75	23,66	25,52	28,98	34,14	53,77	40,57	41,62	2,14	28,09	27,59	35,41
HREEER-Lu(ppm)	11,01	18,04	7,92	9,80	8,14	9,19	11,81	14,18	19,90	13,46	13,77	0,48	10,39	1,44	14,83
□REE(La-Lu)(ppm)	197	20,4	111	181	133	148	198	20,8	56,	40,7	475	35,4	20,4	31,	242
(La/Lu)n	0,78	4,37	2,9,	4,82	3,96	0,19	0,35	2,69	13,0,8	14,91	16,30	220,13	6,48	19,05	4,76
La/Y	0,85	0,77	0,37	0,80	0,50	0,64	0,78	0,56	1,9,	2,0,1	2,27	2,89	0,92	2,23	0,73
Eu/Eu*	0,82	1,24	1,17	1,09	1,13	0,99	0,83	0,73	0,88	1,3	0,91	0,29	0,94	1,08	0,87
Ce/Ce*	0,93	0,81	1,0,7	1,05	1,09	0,96	0,95	1,0,4	0,82	0,80	0,82	0,91	0,97	0,86	0,99
(La/Sm)n	3,36	4,06	1,02	1,90	1,81	2,44	3,14	2,27	7,0,3	7,16	7,69	9,96	3,33	7,02	2,94
(La/Yb)n	0,67	4,01	2,77	4,01	3,63	4,60	0,30	2,63	13,11	14,85	15,87	32,57	6,11	17,31	4,79
(Gd/Yb)n	1,29	0,84	1,42	1,77	1,49	1,42	1,31	1,20	1,01	1,66	1,63	3,08	1,37	1,85	1,22
(Pr/Yb)n	3,44	1,80	3,0,2	4,40	3,48	3,0,7	3,35	2,97	4,97	5,27	5,85	10,61	3,74	6,45	3,19
A.I	19,23	6,06	29,60	29,63	31,69	22,0,9	33,35	28,23	21,76	25,97	22,63	1,45	18,71	24,25	26,84
K.I	8,00	0,12	6,07	5,0,6	4,92	6,43	8,70	9,23	5,61	2,23	7,31	1,45	1,92	2,05	26,05

شده‌اند تا در بررسی میزان تغییرات موجود و ارتباط عناصر خاکی نادر استفاده شوند. ارتباط این شاخص‌ها با یکدیگر در شکل ۸ آورده شده و نتایج زیر قابل استنباط است: در دیوریت- LREE، La/Yb و La/Sm با K.I مشخصی مشخصی بین HREE و مشاهده نمی‌شود که ممکن است به علت فاصله‌ی بیشتر دیوریت‌ها از توده‌ی سینیتی باشد. در سینیت‌ها ارتباط مستقیمی بین La/Yb و La/Sm با K.I وجود دارد که ناشی از افزایش عناصر خاکی نادر سبک طی دگرسانی است، ولی ارتباط بین HREE وارون است و با افزایش شاخص K.I مقدار HREE کاهش می‌یابد که ناشی از عدم تحرک عناصر خاکی نادر سنگین طی دگرسانی است. در پهنه‌ی آگزوسکارن عدم وجود ارتباط مشخص بین La/Sm با K.I و HREE، La/Yb و HREE می‌تواند نشان دهنده‌ی چند سیال با دماهای متفاوت وابسته به اسکارن زایی باشد که ارتباط بین این شاخص‌ها را پیچیده کرده است. ارتباط مشخص بین ضرایب Eu/Eu*-Eu/Eu* در پهنه‌ی دیوریت و پهنه‌ی اسکارن دیده می‌شود و با افزایش K.I مقدار Eu/Eu* کاهش می‌یابد بیهنجاری مثبت Eu با مرحله‌ی اولیه دگرسانی سنگ‌ها در شرایط اسیدی سازگار بوده و بیهنجاری منفی Eu زمانی مشاهده می‌شود که فرایندهای دگرسانی به طور قابل توجهی پیشرفت کرده باشند [۲۱]. این روند در اسکارن با بالا علی مشاهده می‌شود. برای بررسی چگونگی توزیع عناصر خاکی، نادر

شاخص دگرسان (A.I) برای تمام نمونه‌ها محاسبه شد (جدول ۴) و میزان آن از ۱/۴۵ تا ۳۶/۸ متغیر است. با توجه به این اعداد بیهنجاری منفی وابسته به نمونه A12 با پایین-ترین مقدار شاخص دگرسانی (A.I) همخوان است. همبستگی بین نسبت Eu/Eu^* و ضریب A.I در نمونه‌های نزدیک به توده‌ی سینیتی مشخص بوده و با دور شدن از توده‌ی سینیتی در این ارتباط کمتر می‌شود (جدول ۴) بیهنجاری منفی Eu در مگنتیت‌ها می‌تواند به علت جدایش Eu^{+2} از شبکه‌ی مگنتیتی باشد یعنی مگنتیت یک کانی حمل کننده REE است. مگنتیت‌های خالص برخلاف آپاتیت و تیتانو مگنتیت به علت شعاع یونی عناصر تشکیل دهنده‌ی آن تمرکز دهنده‌ی مناسبی برای REE نیست [۱۲]. در این کانسار تجزیه‌ی شیمیایی مگنتیت به روش EMPA نشان دهنده‌ی آن است که مگنتیت یک فاز خالص است، لذا بیهنجاری منفی Eu می‌تواند به خاطر خالص بودن مگنتیت‌ها باشد. ارتباط نزدیکی بین نسبت Eu/Eu^* و مقدار CaO وجود دارد که می‌تواند به علت جایگزینی Eu به جای کلسیم باشد (شکل ۷ ت). بنابراین در حالت کلی بیهنجاری‌های Eu می‌تواند تحت تاثیر میزان پلازیوکلاز و فلدسپات، شاخص دگرسان (A.I)، شرایط اکسیدی کانسار در زمان تشکیل و مقدار CaO باشد. در جدول ۵ میزان درصد اکسیدهای اصلی نمونه‌های تجزیه شده به همراه ضریب دگرسانی (A.I) $\text{K}_2\text{O}/\text{K.I}$ محاسبه

آن‌ها در اپیدوت و مگنتیت به دلیل تشکیل در مرحله اسکارن پسروند است. بررسی‌های انجام شده نشان دهنده‌ی دمای تشکیل گارنت در حدود ۵۰۰-۵۵۰ درجه‌ی سانتیگراد و دمای تشکیل مگنتیت در حدود ۴۰۰-۴۵۰ درجه‌ی سانتیگراد است و عدم وجود ناخالصی‌هایی چون Mg در Cr,V,Ti,Ni,Zn,Mn,Mg کانی مگنتیت بیانگر آن است که این کانی در دمای پایین تشکیل شده است [۲۷]. در کانی‌های تجزیه شده تهی شدگی قابل ملاحظه‌ای از عناصر خاکی نادر در فلوگوپیت نسبت به کانی‌های دیگر دیده می‌شود که می‌تواند ناشی از تاثیر گرمابی-ها یا دگرسانی باشد. با استفاده از نمودار La/Y (شکل ۹ پ) و جدول ۶ مشخص می‌شود که pH محیط تشکیل برای فلوگوپیت و اکتینولیت اسیدی و برای گارنت، مگنتیت و اپیدوت محیط بازی است لذا تهی شدگی REE‌ها در فلوگوپیت می‌تواند ناشی از گرمابی‌ها با خاصیت اسیدی با قابلیت شستن عناصر خاکی نادر باشد. در شرایط اسیدی (محیط تشکیل کانی‌های فلوگوپیت و اکتینولیت) عناصر خاکی نادر شسته شده و مقدار عناصر خاکی نادر کمتر بوده و در شرایط بازی (محیط تشکیل کانی‌های گارنت و اپیدوت)، مقادیر REE بیشتر شده است. میزان پایین عناصر خاکی نادر برای مگنتیت با وجود محیط بازی برای آن به علت خالص بودن مگنتیت بوده که در مباحث قبلی گفته شده است. ارتباط بین Ce و La/Y (شکل ۹ پ) بیان کننده‌ی تشکیل Ce به صورت Ce^{+4} در شرایط اسیدی و زیاد شدن آن در محیط تشکیل کانی‌های فلوگوپیت و اکتینولیت بوده و کمتر بودن آن در شرایط بازی محیط تشکیل کانی‌های مگنتیت، گارنت و اپیدوت به علت تشکیل همبافت عنصر Ce با لیگاندهای کربنات و خارج شدن از گسترهٔ تشكیل این کانی‌ها و بیهنجاری منفی Ce است. با سه پارامتر $\sum_{\text{REE}} \text{Ce}/\text{Ce}^* - \text{Eu}/\text{Eu}^*$ در کانی‌ها می‌توان نتیجه‌گیری کرد که سیالات موثر در کانه‌زایی شامل دو نوع سیال متفاوت بوده که یک نوع دارای عناصر خاکی نادر بیشتر نسبت به سنگ میزبان دیوریتی یا به احتمال زیاد دارای خاستگاه ماقمایی است و نوع دوم سیالات موثر در کانی‌زایی دارای عناصر خاکی نادر کمتری بوده که یا دارای خاستگاه ماقمایی با مقدار عناصر خاکی نادر کم یا دخالت آب‌های جوی در تشکیل این کانی‌ها بوده که با بررسی‌های ایزوتوپی بهتر مشخص می‌شود (شکل ۹ تا ج). با توجه به شکل ۱۰ و جدول ۶ می‌توان گفت خاستگاه محلول‌ها برای تشکیل کانی‌های گارنت و اپیدوت با توجه به نسبت بالای La/Yb، و نبود


در کانی‌ها، و پی بردن به شرایط تشکیل کانی‌ها تعداد ۵ نمونه از کانی‌ها (اپیدوت از پهنه‌ی ۳ (اندواسکارن)، مگنتیت از پهنه‌ی معدنی، گارنت از پهنه‌ی اگزواسکارنی مجاور پهنه‌ی معدنی و اکتینولیت و فلوگوپیت از پهنه‌ی اگزواسکارنی نزدیک به سنگ میزبان دیوریتی) برداشت و تجزیه شدند. با توجه به نتایج تجزیه از کانی‌های اپیدوت، گارنت، فلوگوپیت و مگنتیت در جدول ۶ و الگوی توزیع عناصر خاکی نادر سبک (La-) (HREEs; La- n ، میانی (Nb)، سنگین (Sm-Ho) و سنگین (Nb-Lu) نسبت به پهنه‌ها (شکل ۹ الف - ب) نکات مهم زیر را می‌توان استنباط کرد؛ الگوی توزیع برای کل عناصر خاکی نادر با فاصله از توده‌ی سینیتی به سمت سنگ میزبان بدون در نظر گرفتن گارنت، روند کاهشی را نشان می‌دهد. گستره‌ی وسیع تشکیل اپیدوت و ظرفیت بالای آن برای مشارکت بسیاری از عناصر خاکی نادر (لانتانیوم، سریم) موجب اهمیت آن در شکل گیری شیمیایی سنگ‌های مشتق شده از گوشه و پوسته است، و ساختار شیمیایی بلور بر رفتار عناصر خاکی نادر در کانی‌های گروه اپیدوت تاثیر می‌گذارد [۲۴]. اپیدوت به عنوان یکی از مهمترین کانی‌های اسکارنی، بیشترین مقدار عناصر خاکی نادر را در خود جای داده است که حدود ppm ۱۰۶۰ بوده که بیش از سه برابر گارنت و بیش از ۱۰۰ برابر آن در اکتینولیت و فلوگوپیت است (شکل ۹). درجه‌ی جدایش عناصر REE با نسبت‌های $(La/Yb)n(La/Sm)n(Gd/Yb)n$ در کانی LREE(La-Ce) شدگی چشمگیری از این روند در اسکارن با بالعی مشاهده می‌شود. با توجه به بررسی‌های انجام شده در کانسار بابا علی، اسکارن پیشرونده شامل کانی‌های گارنت و پیروکسن بوده و کانی‌های اپیدوت و مگنتیت در مرحله اسکارن پسروند تشکیل شده‌اند. بنابر بررسی‌های انجام شده در کانسار Century در استرالیا، نسبت پایین عناصر خاکی نادر سبک به عناصر خاکی نادر سنگین بهنجار شده در گارناتهای، نسبت به گارناتهای به علت تشکیل گارناتهای در مراحل اولیه و مصرف شدن عناصر HREE در گارناتهای ۲۶. گارناتهای مانند زیرکن می‌توانند غنی شدگی از عناصر HREE را نشان دهند که می‌تواند به دلیل زایش ابتدائی این کانی‌ها باشد [۷]. در اسکارن بابا علی نیز نسبت پایین $(La/Sm)n(Gd/Yb)n$ در گارنت به دلیل تشکیل گارنت در مرحله اسکارن پیشرونده و نسبت بالای

وابسته به بودن مگنتیت با ماغماتیسم فلزیک در کانسارهای ماغمایی و اسکارنی) پیروی می‌کنند و این با نوع کانسار، خاستگاه اسکارنی و خاستگاه ماغماتیسم فلزیک آن همخوانی دارد.

بیهنجاری مشتت Ce خاستگاه ماغمایی باشد. چهار نوع الگوی پراکندگی عناصر خاکی نادر در مگنتیت پیشنهاد شده اند [۲۸] که مگنتیتهای منطقه از الگوی دوم (الگوی غنی شدگی در عناصر خاکی نادر سبک در ارتباط با پدیده‌ی جدایش


جدول ۵ میزان درصد اکسیدهای اصلی نمونه‌های A1 تا A15

Oxides Sample \	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	MgO	MnO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	TiO ₂	TiO ₂ * ₀	P ₂ O ₅	P ₂ O ₅ * ₁₀	SO ₃	K.I	A.I
A1	60.3	14	6.69	1.84	0.1	6.63	6.6	1.31	1.4	12.95	0.36	3.59	0.01	8	19.2
A2	38.3	5.9	1.8	2	0.39	31.4	0.27	0.04	0.35	3.5	0.75	7.47	0.01	0.12	6.06
A3	52.8	13.3	7.75	4.94	0.12	11.9	3.18	1.41	1.46	14.6	0.32	3.16	0.02	6.57	29.6
A4	52	13.9	6.81	5.29	0.11	11.5	3.61	1.09	1.64	16.44	0.35	3.48	0.01	5.06	29.6
A5	53.6	13	6.84	5.44	0.1	10.5	3.41	1	1.57	15.72	0.35	3.49	0.01	4.92	31.7
A6	53.1	12.7	7	5.23	0.1	10.6	3.22	1.31	1.59	15.88	0.38	3.82	0.01	6.43	32.1
A7	52.4	13.4	8.67	4.45	0.11	8.75	3.28	1.57	1.64	18.4	0.39	3.85	0.01	8.7	33.4
A8	58.3	12	6.83	3.15	0.1	6.87	5.03	1.53	1.59	15.93	0.37	3.65	0.01	9.23	28.2
A9	50.7	13.2	9.19	3.05	0.14	11.1	3.73	1.06	1.71	17.12	0.72	7.15	0.01	5.61	21.8
A10	53.4	11.2	8.29	4.89	0.15	11.3	3.99	0.46	1.55	15.45	0.38	3.83	0.01	2.23	26
A11	54	10.8	12.2	2.64	0.16	9.69	3.64	1.26	1.85	18.54	0.84	8.41	0.01	7.31	22.6
A12	9.38	7.48	7.45	+	0.05	1.97	0.07	0.03	0.1	0.97	0.16	1.56	7.14	1.45	1.45
A13	56.2	12.2	8.66	2.88	0.11	8.16	5.79	0.33	1.7	16.99	0.7	7.01	0.03	1.92	18.7
A14	50.5	11.8	13.5	4.63	0.18	13.4	2.69	0.54	1.06	10.57	0.29	2.94	0.04	2.04	24.4
A15	62.4	13.1	5.5	1.68	0.1	5.85	4.49	4.35	1.14	11.4	0.29	2.87	0.01	26.6	36.8

شکل ۸ ارتباط بین K.I با $(La/Yb)_n$, $(La/Sm)_n$, LREE, HREE


جدول ۶ نتایج آنالیز ICP-MS و میزان عناصر خاکی نادر در کانی‌های انتخابی.

REE Mineral		ppm												
اپیدوت		۲۶۴	۱۰۶	۱۶۵	۱۶۵	۱۶۵	۱۶۵	۱۶۵	۱۶۵	۱۶۵	۱۶۵	۱۶۵	۱۶۵	۱۶۵
مگنتیت		۱۹۰	۷۸۰	۱۷۵	۱۷۵	۱۷۵	۱۷۵	۱۷۵	۱۷۵	۱۷۵	۱۷۵	۱۷۵	۱۷۵	۱۷۵
گارنت		۱۰۰	۷۵۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
اکتینیولیت		۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
فلوگوپیت		۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
	La	۲۶۴	۱۰۶	۱۶۵	۱۶۵	۱۶۵	۱۶۵	۱۶۵	۱۶۵	۱۶۵	۱۶۵	۱۶۵	۱۶۵	۱۶۵
	Ce	۹۰۸	۹۰۸	۹۰۸	۹۰۸	۹۰۸	۹۰۸	۹۰۸	۹۰۸	۹۰۸	۹۰۸	۹۰۸	۹۰۸	۹۰۸
	Pr	۱۹۴۵	۱۹۴۵	۱۹۴۵	۱۹۴۵	۱۹۴۵	۱۹۴۵	۱۹۴۵	۱۹۴۵	۱۹۴۵	۱۹۴۵	۱۹۴۵	۱۹۴۵	۱۹۴۵
	Nd	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
	Sm	۱۵۱۴۵	۱۵۱۴۵	۱۵۱۴۵	۱۵۱۴۵	۱۵۱۴۵	۱۵۱۴۵	۱۵۱۴۵	۱۵۱۴۵	۱۵۱۴۵	۱۵۱۴۵	۱۵۱۴۵	۱۵۱۴۵	۱۵۱۴۵
	Eu	۷۸۸	۷۸۸	۷۸۸	۷۸۸	۷۸۸	۷۸۸	۷۸۸	۷۸۸	۷۸۸	۷۸۸	۷۸۸	۷۸۸	۷۸۸
	Gd	۱۷۴۵	۱۷۴۵	۱۷۴۵	۱۷۴۵	۱۷۴۵	۱۷۴۵	۱۷۴۵	۱۷۴۵	۱۷۴۵	۱۷۴۵	۱۷۴۵	۱۷۴۵	۱۷۴۵
	Tb	۱۷۱۵	۱۷۱۵	۱۷۱۵	۱۷۱۵	۱۷۱۵	۱۷۱۵	۱۷۱۵	۱۷۱۵	۱۷۱۵	۱۷۱۵	۱۷۱۵	۱۷۱۵	۱۷۱۵
	Dy	۹۷۱	۹۷۱	۹۷۱	۹۷۱	۹۷۱	۹۷۱	۹۷۱	۹۷۱	۹۷۱	۹۷۱	۹۷۱	۹۷۱	۹۷۱
	Ho	۱۳۱	۱۳۱	۱۳۱	۱۳۱	۱۳۱	۱۳۱	۱۳۱	۱۳۱	۱۳۱	۱۳۱	۱۳۱	۱۳۱	۱۳۱
	Er	۱۷۲۹	۱۷۲۹	۱۷۲۹	۱۷۲۹	۱۷۲۹	۱۷۲۹	۱۷۲۹	۱۷۲۹	۱۷۲۹	۱۷۲۹	۱۷۲۹	۱۷۲۹	۱۷۲۹
	Tm	۱۷۱۲	۱۷۱۲	۱۷۱۲	۱۷۱۲	۱۷۱۲	۱۷۱۲	۱۷۱۲	۱۷۱۲	۱۷۱۲	۱۷۱۲	۱۷۱۲	۱۷۱۲	۱۷۱۲
	Yb	۱۷۰۷	۱۷۰۷	۱۷۰۷	۱۷۰۷	۱۷۰۷	۱۷۰۷	۱۷۰۷	۱۷۰۷	۱۷۰۷	۱۷۰۷	۱۷۰۷	۱۷۰۷	۱۷۰۷
	LREE/La-Nd (ppm)	۲۲۲۱۱	۲۲۲۱۱	۲۲۲۱۱	۲۲۲۱۱	۲۲۲۱۱	۲۲۲۱۱	۲۲۲۱۱	۲۲۲۱۱	۲۲۲۱۱	۲۲۲۱۱	۲۲۲۱۱	۲۲۲۱۱	۲۲۲۱۱
	Eu/Eu*	۰.۷۷	۰.۷۷	۰.۷۷	۰.۷۷	۰.۷۷	۰.۷۷	۰.۷۷	۰.۷۷	۰.۷۷	۰.۷۷	۰.۷۷	۰.۷۷	۰.۷۷
	MREE Sm-Ho	۱۷۱۴	۱۷۱۴	۱۷۱۴	۱۷۱۴	۱۷۱۴	۱۷۱۴	۱۷۱۴	۱۷۱۴	۱۷۱۴	۱۷۱۴	۱۷۱۴	۱۷۱۴	۱۷۱۴
	LREE La-Nd	۲۲۲۱۱	۲۲۲۱۱	۲۲۲۱۱	۲۲۲۱۱	۲۲۲۱۱	۲۲۲۱۱	۲۲۲۱۱	۲۲۲۱۱	۲۲۲۱۱	۲۲۲۱۱	۲۲۲۱۱	۲۲۲۱۱	۲۲۲۱۱
	(Ce/Ce*)*	۰.۷۷	۰.۷۷	۰.۷۷	۰.۷۷	۰.۷۷	۰.۷۷	۰.۷۷	۰.۷۷	۰.۷۷	۰.۷۷	۰.۷۷	۰.۷۷	۰.۷۷
	La/Y	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰



شکل ۹ نمودارهای مربوط به کانی‌های اپیدوت، گارنت، مگنتیت، اکتینیولیت و فلوگوپیت

(الف) تمرکز عناصر خاکی نادر سبک (LREEs Er-Nb) (Ce/Ce*) (HREEs Er-Lu) (MREEs Sm-Ho) و سنگین (HREEs La-Nb) (Ce/Ce*) در مقایسه با دیوریت میزان (ج) Eu/Eu* نسبت به REE در مقایسه با دیوریت میزان (ث) Eu/Eu* نسبت به Ce/Ce* در مقایسه با دیوریت میزان (ب) در مقایسه با دیوریت میزان (د).



شکل ۱۰ فراوانی عناصر خاکی نادر در کانی‌ها (الف) بهنجار شده با کندریت‌ها [۶] (ب) بهنجار شده با دیوریت میزان .

شرایط اکسیدی کانسار در زمان تشکیل و مقدار CaO باشد. خاستگاه محلول‌ها برای تشکیل کانی‌های گارنت و اپیدوت با Ce توجه به نسبت بالای La/Yb و نبود بیهنجاری مثبت Ce خاستگاه ماگمای دارد. در میان کانی‌های برداشت شده، اپیدوت بیشترین غنی شدگی و اکتینولیت کمترین غنی شدگی از عناصر خاکی نادر را نشان می‌دهد. استفاده از ترکیبات شیمیایی تشکیل دهنده سنگ‌ها شامل CaO، Na₂O، K₂O P₂O₅ و MgO و ارتباط بین میزان عناصر خاکی نادر با CaO و Eu می‌تواند به عنوان شاخص‌های ژئوشیمیایی مفید در پی جویی‌ها بکار برد شود. بررسی میزان عناصر خاکی نادر در تمامی واحدهای سنگی اطراف معدن و مناطق مشابه می‌تواند در تفسیر بهتر نتایج مفید باشد. در صورت اقتصادی شدن بهره برداری عناصر خاکی نادر از اپیدوت می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

مراجع

- [1] Amiri M., "Petrography of the Almouglagh" Unpublished PH.D Thesis, University of Tarbiat-e-Moalem, Tehran, Iran, 1995, 231p(in Persian).
- [2] Darvishzadeh A., "Geology of Iran", Nashre Danesh , Tehran, Iran, 1992, 901p (in Persian)
- [3] Zamanian H., "Iron mineralization related to the Almoughlagh and south Ghorveh batholiths, western Iran, with a specific reference to Baba Ali and Gelali deposits", thesis submitted for degree of PhD, Univercity of Pune, 2003, 215p
- [4] Zamanian H., Asadollahi B., "Geochemistry and ore potential of the Almoughlagh batholiths. Western Iran", Geologos 19.3, 2013., 229-242.
- [5] امامی م.، "ماگماتیسم در ایران، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور"، چاپ اول، ۱۳۷۹، ۶۰۸ صفحه.
- [6] Taylor Y., McLennan SM., "The Continental Crust: Its Composition and Evolution", 1 st ed. Blackwell, Oxford 1985.312p.
- [7] Rollinson H., "Using Geochemical data: Evolution, presentation, interpretation", Longman Scientific and Technical, London, 1993.352p

برداشت

رونده کلی تغییرات میزان عناصر خاکی نادر کاهش در مگنتیت-ها بوده که به دلیل وجود کانی اپیدوت در پهنه قبلاً از اگزو اسکارن در مسیر جریان محلول‌ها است که درصد بالایی از عناصر خاکی نادر را در خود جمع می‌کند و یا به علت حمل عناصر خاکی نادر به وسیله‌ی همبافت‌های فلوریدی یا کلرایدی و یا به دلیل خالص بودن مگنتیت‌هاست. ارتباط نزدیک بین نسبت CaO/Eu* و مقدار Eu/Eu* به جای کلسیم است. همبستگی بین نسبت Eu/Eu* و ضریب A.I در نمونه‌های نزدیک به توده‌ی سینیتی مشخص بوده و با دور شدن از توده‌ی سینیتی این ارتباط کمتر می‌شود. با توجه به تشکیل این کانسار در عمق کم و اکسیدی بودن آن، می‌توان عدم بیهنجاری مثبت Eu را در پهنه‌ی مگنتیت به شرایط اکسیدی کانسار در زمان تشکیل نسبت داد. عدم وجود ارتباط مشخص بین ضرایب Eu/Eu*-A.I در پهنه‌ی اگزو اسکارنی نشان‌دهنده چند سیال با دماهای متفاوت وابسته به اسکارن‌زایی است. مقدار عناصر خاکی نادر در پهنه‌ها با نمودار La/Y همبستگی خوبی در پهنه‌ی اگزو اسکارنی نشان می‌دهد و دو گروه مختلف را در پهنه‌ی اگزو اسکارنی می‌توان مجزا کرد در بخش با شرایط اسیدی عناصر خاکی نادر شسته شده و مقدار عناصر خاکی نادر کمتر است و در بخش بازی مقداری REE بالا بوده در گستره‌ی ۴۰۷,۳۳-۴۰۷,۵۷ ppm تا ۵۵۹,۵۷ ppm تغییر می‌کند. نسبت پایین عناصر خاکی نادر سبک به سنگین بیهنجار شده در گارنت به دلیل تشکیل آن در اسکارن پیشونده و نسبت بالا در اپیدوت و مگنتیت به دلیل تشکیل آن‌ها در اسکارن پیشونده است. عدم وجود ناخالصی‌هایی چون Cr,V,Ti,Ni,Zn,Mn,Mg که این کانی در دمای پایین تشکیل شده است. همبستگی مثبتی بین عناصر خاکی نادر با P₂O₅ در منطقه‌ی اسکارنی دیده می‌شود. در حالت کلی بیهنجاری‌های Eu می‌تواند تحت تاثیر میزان پلازیوکلаз و فلدسپات، شاخص دگرسانی (A.I)

- [18] Karadag M., Kupeli S., Aryk A., aYHan A., Zedef V., Doyen A., "Rare earth elements(REE) geochemistry and genetic implications of the Mortas bauxite deposit (Seydisehir/Konya-Southern Turkey)", Chemie Erde-Geochem 69,2009,143-159.
- [19] Kikawada Y., "Experimental studies on the mobility of lanthanides accompanying alteration of andesite by acidic hot spring water", Chemical Geology 176 (2001) 137-149.
- [20] Wood S.A., "The aqueous geochemistry of the rare-earth elements and Yttrium. Theoretical predictions of speciation in hydrothermal solutions to 350 °C at saturation water vapor pressure", Chemical Geology 88 (1990) 99-125.
- [21] Schnetzler C.C., Philptt J.A., "Partition coefficients of rare-earth elements between igneous matrix material and rock-forming mineral phenocrysts ", Geochimica Cosmochimica Acta 34 (1970) 331-340.
- [22] Ishikawa Y., Sawaguchi T., Iwaya S., Horiuchi M., "Delineation of prospecting targets for Kuroko deposits based on modes of volcanism of underlying dacite and alteration halo", Min. Geol. (Japan) 26 (1976) 105–117.
- [23] Shikazono N., Ogawa Y., Utada M., Ishiyama D., Mizuta T., Ishikawa N., Kubota Y., "Geochemical behavior of rare earth elements in hydrothermally altered rocks of the Kuroko mining area", Japan, Journal of Geochemical GEXPLO-04513 (2008) No of Pages 15.
- [24] Wing B.A., Ferry J.M., Harrison T.M., "Prograde destruction and formation of monazite and allanite during contact and regional metamorphism of pelites, petrology and geochronology, Contribution.", Mineralogy Petrology 145 (2003) pp. 228-250.
- [25] Frei D., Liebscher A., Shaw CS., "Crystal chemical controls on rare element partitioning between epidote group mineral and melt, an experimental and theoretical study", Contrib. Mineralogy. Petrology. 146 (2003) pp. 192-204.
- [26] Spry PG., et al., "Discrimination of metamorphic and metasomatic processes at the [8] Rard J.A., "Aqueous solubility's of praseodymium, Europium, and lutetium sulfates", Journal of solution chemistry 17,1988,499-517.
- [9] Knarchenko S.M., Pokrovsky B.G., "The tomotor alkaline ultrabasic massif and related REE-Nb deposit, Northern Siberia", Eco.Geo., Vol. 90,1995 pp. 676-689.
- [10] Crinci J., Jurkowi C., "Rare earth elements in Triassic bauxites of Croatia Yugoslavia", Travaux 19,1990,239-248.
- [11] Goldstrin S.J., Jocobsen S.B., "rare earth element in river waters", Earth and planetary Science.89 (1988) 35-47
- [۱۲] اسدی س، "مطالعه کانی‌زایی آهن در مجموعه سنگ‌های دگرگونی کوه قرمز- کوه سرخ (قطروئیه، استان فارس)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، (۱۳۸۸)، ص ۱۵۴.
- [13] Aubert D., Stille P., probst a., "REE fractionation during granite weathering and removal by waters and suspended loads:Sr and Nd isotopic evidence", Geochim Cosmochim Ac 65 (2001) 387-406.
- [14] Yosoff ZM., Ngwenya B.T., Parsons I., "Mobility and fractionation of REE during deep weathering of geochemically contrasting granites in a tropical setting", Malaysia, Chemical Geology Vol. (2013) 349-350.pp 71-86.
- [15] Oreskes N., Einaudi T.M., "Origin of rare earth element-enriched hematite breccias at the Olympic dam Cu-U-Au-Ag deposit, Roxby downs, south Australia", Economic geology. vol.85 (1990) 1-28.
- [16] Kato Y., "Rare earth elements as an indicator to origins of skarn deposits, example of the Kamioka Zn-Pb and Yoshiwara - Sannotake (Cu-Fe) deposit in Jappan, Resource geology", V. 49, NO. 4, 1999 PP. 183-198.
- [17] Bankultz P., Bau U., Seltmann R., "Magnetite Ore bearing belts of protozoic and lower Paleozoic age in Europe-comparison between the Besser Arc (Germany) and the Bergslagen province (Sweden)", Mineral deposits, papuhan Rotterdam (1997) 36p.

- [28] Meinert L.D., "Igneous petrogenesis and skarn deposits. Geological Association of Canada, special paper", V. 40 (1995) pp. 569-583.
- [27] Ramdohr P., "The ore minerals and their intergrowth", 2nd ed., Intern. Ser. in Earth Sci., London. Pergamon Press, V.35, 1980, 1205 p.
- Broken Hill Pb-Zn-Ag deposit, Australia: Rare earth element signatures of garnet-rich rocks", Econ Geol 102 (2007) 471-494.