



تأثیر بستر کربناتی در شکل‌گیری کانسارهای سرب و روی شمال غرب شهرمیرزاد، البرز مرکزی، ایران

کمال الدین بازرگانی گیلانی^{۱*}، بهزاد مهرابی^۲، مرتضی ربیعی^۱

۱. دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده زمین‌شناسی
۲. دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکده علوم، گروه زمین‌شناسی

(دریافت مقاله: ۸۷/۱۰/۱ ، نسخه نهایی: ۸۸/۵/۲۴)

چکیده: کانسارهای سرب و روی گونه‌ی دره‌ی می‌سی‌سی پی شمال سمنان را می‌توان به دو مجموعه "ارم" در شمال غرب شهرمیرزاد و "شهرمیرزاد" در جنوب و شرق شهرمیرزاد تفکیک کرد. سنگ میزبان این کانسارها از واحدهای کربناتی کرتاسه است و گسلش در کنترل کانه‌زایی درونزاد در هر دو نقش اساسی دارد. شواهد سنی، کانی‌شناسی و ساختاری بیانگر خاستگاه مشترک هر دو مجموعه کانه‌سازی است ولی با این حال تفاوت‌های زیادی در بستر کربناتی این دو مجموعه‌ی کانه‌زایی دیده می‌شود. بررسی‌های سنگ‌شناختی نشان می‌دهد که سنگ میزبان کانسارهای ارم در رخسارهای عمیق دریابی تنه‌شین شده که نفوذپذیری بسیار کمی دارند و دولومیتی شدن در این دنباله دیده نمی‌شود. در حالی که سنگ میزبان کانسارهای شهرمیرزاد رخسارهای کم عمق را که نفوذپذیری بالایی دارند نشان می‌دهند و دولومیتی شدن گستردگی در این دنباله صورت گرفته است. نبود رخسارهای نفوذپذیر و دولومیت در بستر کربناتی کانسارهای شمال غرب شهرمیرزاد از چرخش و حرکت شاره‌های کانه‌زای درون میزبان کربناتی جلوگیری کرده است که این مستله با مقادیر پایین سرب (کمتر از ۵ ppm) و روی (کمتر از ۲۰ ppm) در سنگ میزبان همخوانی دارد. احتمالاً این نفوذناپذیری از ایجاد فرآیند برونزادی در مجموعه‌ی کانسارهای شمال غرب شهرمیرزاد نیز جلوگیری کرده است. تعیین ترکیب ایزوتوپی کربن و اکسیژن بستر کربناتی نیز تا حدودی نقش کانی‌سازی درونزاد در ایجاد تغییرات رئوشیمیابی و عدم تأثیر شاره‌های دیاژنتیکی بر سنگ میزبان را نشان می‌دهد. وجود رخسارهای کم عمق، نفوذپذیری و نیز دولومیتی شدن سنگ میزبان کانسارهای جنوب و شرق شهرمیرزاد سبب شد تا شاره‌ها امکان حرکت و چرخش درون بستر کربناتی را داشته باشند را پیدا کنند و این چرخش عاملی برای افزایش سرب (با میانگین ۱۳۲ ppm) و روی (با میانگین ۹۸ ppm) در بستر کربناتی و نیز شکل‌گیری گستره‌ی کانه‌های برونزاد در این ناحیه شده است. این کار پژوهشی نشان می‌دهد که کانی‌سازی درونزاد سرب و روی در مجموعه ارم در اثر فرآیندهای دیرزاد و بدون تأثیر از بستر کربناتی شکل گرفته و کنترل کننده‌های ساختاری نقش بنیادی در تمرکز کانی‌سازی داشته است.

واژه‌های کلیدی: کانسار سرب و روی، رخسارهای ته نشستی، نفوذ پذیری، چرخش شاره‌ها، دولومیتی شدن.

"شهرمیرزاد" در جنوب و شرق شهرمیرزاد و ارم در شمال غرب شهرمیرزاد تفکیک کرد. مجموعه‌ی شهرمیرزاد کانسارهای رضا آباد، رضابرک، بزملا و حیدر آباد را شامل می‌شود، و دارای ذخیره‌ی قطعی ۷۰۰۰۰ تن با عیار ۱۱/۵ درصد سرب و ۹/۰۷ درصد روی است. مجموع کانسارهای آسaran، ارم بزرگ و ارم

مقدمه
سنگ‌های کربناتی کرتاسه ناحیه‌ی شهرمیرزاد، در ۳۰ کیلومتری شمال شهر سمنان، در برگیرنده‌ی کانسارهای متعدد سرب و روی هستند (شکل ۱). با توجه به موقعیت این کانسارها نسبت به شهر شهرمیرزاد، آن‌ها را می‌توان به دو مجموعه‌ی


مختلف [۱، ۸، ۱۳، ۱۵] این موضوع را تایید می‌کند.

زمین‌شناسی منطقه‌ای

منطقه‌ی شهمیرزاد در بخش زمین‌ساختی البرز قرار گرفته است. شکل‌گیری این رشته کوه شدیداً مشروط بر واژگونی گسل‌های کششی قبلی بوده که مخصوصاً در بخش جنوبی این رشته کوه بسیار چشمگیر است [۱۸]. تراستهای رخمنون یافته که جابجایی زیادی دارند، در نیمه‌ی جنوبی مشاهده می‌شوند، جایی که لایه‌های پرکامبرین در چندین ناحیه روی لایه‌های ترشیری رانده شده‌اند [۷]. گسل بشم نیز از جمله‌ی این گسل‌های تراستی است که سبب شده، در ناحیه شهمیرزاد، دنباله‌ی بزرگی از سنگ‌های پالئوزوئیک روی تمنشست‌های سنتزوزنیک رانده شود (شکل ۱). عملکرد این گسل، سنگ آهک‌های کرتاسه میزبان سه کانسار ارم کوچک، آساران، و ارم بزرگ را از دیگر سنگ‌های کربناتی کرتاسه جنوب شرقی شهمیرزاد جدا کرده و این دنباله را در درون دشت فروافتاده چاشم در شمال غربی شهمیرزاد قرار داده است (شکل ۱). مرزهای بالایی و پایینی سنگ آهک‌های کرتاسه میزبان کانسارهای مورد بررسی، در دشت چاشم، گسله است و بررسی ارتباط دقیق کانه‌سازی با واحدهای بالایی و پایینی کرتاسه و شناسایی چگونگی تشکیل این کانسارها نیازمند بررسی و مقایسه با دنباله‌های برجای هم‌zman آن در جنوب شرقی شهمیرزاد است.

کوچک نیز تحت عنوان کانسار سرب و روی ارم شناخته شده و در مجموع ذخیره‌ی قطعی ۱۰۰۰۰۰ تن با عیار تقریبی بیش از ۱۳ درصد سرب دارند. در ارتباط با چگونگی شکل‌گیری و ژئوشیمی کانسارهای سرب و روی شهمیرزاد بررسی‌هایی نظیر [۶، ۳] انجام شده است، ولی چگونگی تشکیل و ژئوشیمی کانسارهای ارم بزرگ، ارم کوچک و آساران، در شمال غرب شهمیرزاد، تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. با توجه به وجود شباهت‌های کانی‌شناسی، ساختاری و سن نسبی بین این دو مجموعه کانه‌ی‌زایی در شمال غرب و جنوب شرق شهمیرزاد، تأثیر سنگ میزبان در چگونگی شکل‌گیری این دو مجموعه‌ی کانه‌زا کمتر مورد بحث قرار گرفته است. با این حال بررسی اخیر تغییرات قابل ملاحظه‌ای در دگسانی و ژئوشیمی سنگ میزبان این دو مجموعه کانه‌زا را تأیید می‌کند که می‌تواند ناشی از تفاوت رخساره‌های ته نشستی سنگ میزبان این کانسارها باشد. بر این اساس، در این کار پژوهشی سعی شده است تا به با بررسی‌های سنگنگاری و ژئوشیمی سنگ میزبان کربناتی و ارتباط آن با کانه‌زایی، در کانسارهای شمال غرب شهمیرزاد، تأثیر بستر کربناتی در ایجاد تفاوت‌های مشاهده شده بین این دو مجموعه کانساری مورد بررسی قرار گیرد.

از طرف دیگر ارتباط ژئوشیمیابی بین سنگ‌های میزبان کربناتی و کانه‌زایی در کانسارهای سرب و روی، ایزار مناسبی در پی‌جوابی کانسارهای مشابه است و بررسی‌های پژوهشگران



شکل ۱ نقشه‌ی زمین‌شناسی ساده شده منطقه‌ی شهمیرزاد (شمال سمنان). رخمنون واحدهای کرتاسه و موقعیت برخی از کانسارهای سرب و روی در این ناحیه دیده می‌شود (۱: آساران، ۲: ارم بزرگ، ۳: ارم کوچک، ۴: رضا آباد، ۵: بزملا، ۶: حیدر آباد، ۷: رضا برک، ۸: دریند، ۹: لاودار). توالی کرتاسه در شمال سمنان میزبان بیشترین کانه‌زایی سرب و روی در این منطقه است.

ترکیب ایزوتوبی کربن و اکسیژن در دانشگاه ارلانگن نورنبرگ آلمان مورد تجزیه ایزوتوبی قرار گرفتند.

سنگنگاری کانسنتگی

در کانسارهای شمال غرب شهرمیرزاد مهم‌ترین کانه درونزد گالن است که در دو مرحله یا با دو نسل متفاوت دیده می‌شود (شکل ۲). در مرحله‌ی اول گالن به شکل بلورهای خود شکل با بافت موزائیکی همراه با اسفالریت و کلسیت درشت بلور مشاهده می‌شود، که به صورت رگه‌ای در راستای گسل‌ها قرار گرفته است (شکل الف^۳). نسل دوم گالن نیز پس از مرحله‌ی اصلی کانه سازی و به صورت تراووشی به درون بلورها نفوذ کرده و آن‌ها را دربرگرفته است. در هر سه کانسار ارم کوچک، آساران و ارم بزرگ گالن مرحله‌ی دوم به صورت سیمان بین قطعات برشی گسلی را پر کرده است (شکل ب^۳).

اسفالریت نیز به صورت خودشکل همراه با گالن مرحله‌ی اول تشکیل شده و به رنگ عسلی روشن دیده می‌شود. پیریت با فراوانی بسیار ناچیز در دو نسل متفاوت مشاهده می‌شود. نسل اول قبل از مرحله‌ی اصلی کانه‌زایی در سنگ‌های میزبان تشکیل شده و نسل دوم در طول نفوذ رگه‌های کلسیت و پس از گالن مرحله‌ی دوم ایجاد شده است (شکل ج^۳). فرآیند برونزاد در این سه کانسار به صورت محدود عمل کرده و تنها سبب شکل‌گیری مقادیر اندکی سروزیت و آنگلزیت شده است (شکل ۴).

کانه‌زایی کانسارهای آساران، ارم کوچک و ارم بزرگ، در راستای گسل‌های فرعی با راستای تقریبی شمال غرب-جنوب شرق رخ داده و گسل‌ش را می‌توان مهم‌ترین کنترل کننده‌ی کانه‌زایی درونزاد در گستره‌ی این سه کانسار در نظر گرفت (شکل ۴).

در گستره‌ی کانسارهای جنوب شرقی شهرمیرزاد، سازندهای لار، دلیچای و شمشک در برخی نقاط به صورت گسله و در مواردی با مرز پیوسته در زیر سنگ آهک‌های کرتاسه این ناحیه قرار گرفته‌اند. در این ناحیه سازنده لار دارای سنگ‌شناسی آهکی ضخیم لایه، دلیچای مارن و شمشک شیلی و ماسه سنگی است. روی دنباله‌ی کرتاسه نیز کنگلومرای فجن با مرز ناپیوسته دیده می‌شود و روی آن دنباله‌ی نسبتاً ضخیمی از توفها، شیل‌ها و مارن‌های ائوسن وجود دارد.


سنگ آهک‌های کرتاسه ناحیه‌ی شهرمیرزاد، ضخیم لایه، و به رنگ خاکستری تیره دیده می‌شوند. کانه‌زایی سرب و روی فقط در این کربنات‌ها رخ داده و به طور کلی گسترش کانسارها با کنترل کننده‌ی چینه‌ای و گسل‌های با راستای تقریبی جنوب شرق- شمال غرب کنترل می‌شود.

روش بررسی

به منظور بررسی تغییرات سنگنگاشتی و ژئوشیمیایی دنباله‌ی کربناتی در بر گیرنده‌ی این کانسارها، در راستای سه برش عمود به لايه‌بندی سنگ میزبان، ۷۳ نمونه برداشت شده است. مقاطع نازک تمامی این نمونه‌ها به روش آليزارين رد-اس رنگ آميزي و سپس با ميكروسكوب قطبشي بررسی شدند و ۱۱ مورد از نمونه‌های برش ارم کوچک نیز به منظور کانی‌شناسی سنگ میزبان کربناتی با پراش سنج پرتو ايکس (XRD) در سازمان زمین‌شناسی و اكتشافات معدنی کشور تجزیه شد. برای بررسی‌های کانی‌شناسختی و بافتی مواد معدنی نیز تعداد ۳۰ مقطع نازک و ۸ مقطع صيقلى بررسی شدند. همچنان ۹ نمونه از برش آساران و ارم کوچک به روش ICP-MS و ICP-OES در آزمایشگاه ACME در کانادا تجزیه شيميايی شدند. ۸ نمونه از برش آساران و برش ارم کوچک نیز برای شناسايی

Brecciation	Stage 1	Stage 2	Stage 3
Mineral		Hypogene	Supergene
Calcite	—	—	—
Quartz	—	—	—
Galena	—	—	—
Sphalerite	—	—	—
Pyrite	—	—	—
Cerussite	—	—	—
Anglesite	—	—	—
Goethite	—	—	—

شکل ۲ دنباله‌ی پاراژنی مجموع کانسارهای ارم کوچک و آساران در شمال شهرمیرزاد. تغییر فراوانی کانی‌ها با رنگ و ضخامت عدسی‌ها و نیز تغییرات رنگ زمینه نشان داده شده.



شکل ۳ (الف) رگه‌ی کلسیتی نسل دوم همراه با گالن مرحله‌ی اول یا نسل اول و اسفالریت، قطعه‌های برشی سنگ میزبان را در برگرفته است. (ب) تصویر میکروسکوپی از گالن و اسفالریت خود شکل همراه با کلسیت‌های متبلور رگه‌ای. (ج) گالن مرحله‌ی دوم که به صورت تراوشی سنگ میزبان و کلسیت رگه‌ای را برشی کرده است. (د) حالت بی‌شکل و تراوشی گالن نسل دوم در این شکل به خوبی دیده می‌شود و بین دانه‌های برشی کلسیت رگه‌ای و سنگ میزبان نفوذ کرده است. (ه) ذرات نسبتاً ریز پیریت که به طور پراکنده درون رگه‌ی کلسیتی قرار گرفته‌اند. پیریت‌های نسل اول و دوم در نمونه وجود دارند. نسل اول پیریت به صورت نسبتاً خودشکل وجود دارد در حالی که نسل دوم به شکل لایه‌ای بین بلورهای دیگر قرار گرفته است. (ز) اجتماع بلورهای تیغه‌ای و شعاعی سروزیت در فضاهای خالی و شکافهای کارستی در کانسار آسaran. Ga: گالن، Sph: اسفالریت، Py: پیریت، Ca: کلسیت.



شکل ۴ (الف) رگه‌ی اصلی حاوی گالن، اسفالریت و کلسیت در کانسار ارم کوچک که در راستای گسل شمال غربی-جنوب شرقی تشکیل شده است. B- رخنمونی از رگه‌ی کانه‌دار در تونل اصلی کانسار آساران که با گسل کنترل شده است.

گسل‌های با راستای شمال غربی-جنوب شرقی صورت گرفته است.

سنگ نگاری رسوی

در بسیاری از کانسارهای سرب و روی با بستر کربناتی، عواملی نظری دولومیتی شدن، تغییرات رخساره و نفوذپذیری اولیه‌ی سنگ میزبان آهکی از کنترل کننده‌های اصلی در شکل‌گیری کانسار و هاله‌های لیتو ژئوشیمیایی پیرامون توده‌یمعدنی هستند [۱۲، ۱۱].

کانسارهای بزرگی مانند ویبورنوم ترند، الد لد بلت، پاین پوینت، گایس ریور و گایبنا ریور نمونه‌های شاخصی از معادن وابسته به کمپلکس‌های ریفی هستند [۱۱]. در کانسارهای جنوب چاشم نیز مهم‌ترین عوامل مؤثر در پراکندگی و ایجاد هاله‌های ژئوشیمیایی، تغییرات رخساره‌ای و دولومیتی شدن عنوان شده است [۵].

کمپلکس‌های ریفی و کمپلکس‌های سدی کربناته، بخش‌هایی از یک توالی هستند که در آن تغییرات شدید در رخسارهای رسوی سبب ایجاد زونی با نفوذپذیری بالا می‌شود. این تغییرات ناگهانی افقی یا عمودی در یک دنباله‌ی رسوی، موقعیت بسیار مناسبی را برای آمیختن شاره‌ها و رخداد فرایندهای فیزیکوشیمیایی ایجاد می‌کند و باعث رسوی ماده‌ی معدنی می‌شود [۱۱]. همچنین در مواردی محیط رسویگذاری

در کانی‌سازی‌های جنوب شرقی شهرمیرزاد نیز کانه‌های درونزد دارای پاراژنز بسیار ساده هستند و شامل کانی‌های گالن، اسفالریت، پیریت \pm کائولن هستند. بلورهای خود شکل گالن در رگه‌های معدن رضا آباد همراه با کلسیت‌های آهنگین سیاه و سفید درشت بلور تشکیل شده‌اند و جانشینی بلورهای خود شکل گالن در سنگ دیواره نیز دیده می‌شود.

در بزملا و دریند کانی‌های درونزد سولفیدی، سیمان برش‌ها را تشکیل داده و یا در درون قطعات برش گسلی یا برش کارستیک وجود دارند. در کانسارهای این ناحیه، گالن به صورت پرکننده‌ی حفره‌ها و شکستگی‌ها و یا بلورهای خود شکل جانشینی در دولومیت است. همچنین، مشابه کانسارهای شمال غرب شهرمیرزاد، مقدار گالن در این کانسارها بسیار بالاتر از میزان اسفالریت است.

کانی‌های برونزاد در کانسارهای جنوب شرقی شهرمیرزاد گسترش زیادی دارند. در معادن رضا آباد و حیدر آباد با توجه به میزان فراوانی، کانی‌های برونزاد سروزیت، آنگلزیت، هماتیت، گوتیت، مینیوم، ویلمیت و لیمونیت دیده می‌شود. در بزملا و دریند همی مورفیت، سروزیت، آنگلزیت، هماتیت، گوتیت و لیمونیت، بیشتر کانی‌های برونزاد هستند و در مجموع کانی‌های برونزاد روی به مراتب بیشتر از سرب است [۳].

در مجموعه‌ی کانسارهای جنوب شرقی شهرمیرزاد نیز، مشابه با کانسارهای شمال غرب شهرمیرزاد، کانی‌زایی بیشتر در

در زیر میکروسکوپ شبیه SMF4 فلوگل و محیط پنجه شیب تختگاه کربناتی است (شکل ۵، F2).

آلوكتونوس بایوکلاستیک فلوتسون

ذرات اسکلتی درشت دانه‌ی این رخساره در زمینه‌ای گلی و ریز دانه مشاهده می‌شوند. خرددهای فسیلی، جورشدگی و گردشگی بسیار ضعیفی دارند و سمت‌گیری ترجیحی نشان می‌دهند. فسیل‌ها و خرددهای فسیلی این رخساره، در کنار یکدیگر تنوع فراوانی دارند و احتمالاً ناشی از یک ریف هستند که در بخش‌های بالایی تختگاه و در پایی شیب ریخته‌اند. این رخساره در زیر میکروسکوپ بسیار شبیه به ۵ SMF فلوگل و زون رخساره‌ای چهار است. وجود شواهد بالا همراه با خرددهای جلبکی و قطعات فرامینیفر نشان می‌دهد که این رخساره به دامنه‌ی شیب سکوی داخل دریا وابسته است (شکل ۵، F3).

بررسی‌های سنگ‌شناختی این سنگ آهک‌ها نشان داده است که این کربنات‌ها احتمالاً در بخش‌های بالایی شیب قاره و بخش‌های پایین سد ریفی تا حوضه‌های عمیق اقیانوسی، در یک طاقچه‌ی کربناتی تهنشین شده کرده‌اند (شکل ۵).

نتایج بررسی‌ها نشان داده که سنگ آهک‌های دنباله‌ی کرتاسه در جنوب شرقی شهرمیرزاد در یک تختگاه کربناتی کم عمق از نوع شیب راهه با بخش جلویی شیب راهه خارجی، میانی و داخلی در آن قرار دارد (شکل ۶). در این دنباله ته نشسته شامل ۱۵ رخساره کربناتی هستند که با توجه به محیط تشکیل آن‌ها، در سه گروه A، B و C قرار می‌گیرند. گروه رخساره‌ی A در یک محیط با انرژی پایین با نرخ ته نشستی آرام، در یک محیط دور از ساحل، در شیب راهه خارجی و یا میانی بر جای گذاشته شده است. گروه رخساره‌ی B در گستره‌ی ریف کومه‌ای و بالایی شیب، در شیب راهه میانی، ته نشین شده است. گروه رخساره‌ی C نیز در شیب راهه داخلي و در محیط لاغون و در نواحی ساحلی تهنشین شده است [۴]. دنباله کرتاسه در شمال غرب شهرمیرزاد که میزان کانسارت‌های آسaran، ارم کوچک و ارم بزرگ است، تنها با گروه رخساره‌ای A در جنوب شرق شهرمیرزاد همخوانی دارد، در حالی که در جنوب و شرق شهرمیرزاد، کانی‌زایی بیشتر در رخساره‌های کم عمق (گروه‌های رخساره‌ای C و B) رخ داده است.

تعیین کننده‌ی رژیم‌های هیدرولوژیکی مسئول کانه‌سازی و یا دولومیتی شدن ناشی از دیاژنز اولیه هستند [۱۳].


در این مقاله نیز با بررسی نمونه‌های برداشت شده از دنباله‌ی کرتاسه میزان کانسارت‌های آسaran، ارم کوچک و ارم بزرگ، رخساره‌ها و تغییرات رخساره‌ای حاکم بر این دنباله‌ها مورد بررسی قرار گرفته‌اند. بررسی‌های صحرایی، ماکروسکوپی و میکروسکوپی دنباله‌های یاد شده و مقایسه آن با رخساره‌های میکروسکوپی استاندارد ارائه شده توسط [۹، ۱۷]، منجر به شناسایی سه رخساره‌ی میکروسکوپی رسوبی شد که عبارتند از:

اسکلتال مادستون / وکستون


این رخساره در زیر میکروسکوپ به صورت فرامینیفرهای پلانکتیک پیتونلا اوالیس و کلسی اسفلولا، و شناور در زمینه‌ی میکرایتی دیده می‌شود. هندسه‌ی برگه‌ای، ضخامت کم، ترکیب آهکی، بافت مادستونی و وکستونی این رخساره با گل فراوان وجود سنگواره‌های شکسته نشده و سالم از نوع فرامینیفر پلانکتیک و رنگ تیره‌ی زمینه (حاکی از حضور ماده‌ی آلی زیاد) نشان‌دهنده‌ی انرژی پایین محیط و رخساره‌ی آبهای عمیق حوضه‌ای بوده و معادل زون رخساره‌ای یک فلوگل (F1) است (شکل ۵).

بایو-لیتو کلاستیک پکستون

در این رخساره، لیتوکلاست‌ها که همراه با ذرات ریز و گل هستند، جورشدگی و گردشگی کمی دارند و شامل قطعاتی در اندازه‌های تقریباً متفاوت‌اند. این رخساره نسبت به رخساره قبلي درشت دانه‌تر است و همراه با اکستراکلست‌های (ذرات کوارتز نابرجا) حمل شده به وسیله‌ی جریان‌های خردendar مشاهده می‌شود. بایوکلاست‌ها [ازیست آواری‌ها] معمولاً از خرددهای فرامینیفرها و پوسته‌ی آن‌ها تشکیل شده‌اند. دانه‌ها سمت‌گیری مشخصی را از خود نشان نمی‌دهند. حضور همزمان دانه‌های با اندازه‌های متفاوت، ذرات کوارتز نابرجا و بایوکلست‌ها [ازیست آواری‌ها] نشان‌دهنده‌ی مناطق کم عمق است و در کنار سنگواره‌های پلانکتیک و میکرایت، بیانگر وجود جریان‌های شدید توربیدایتی است که ته نشسته‌های مناطق کم عمق را به سمت مناطق عمیق شسته و حمل کرده‌اند. این رخساره



شکل ۵ موقعیت نسبی رخسارهای F1، F2 و F3 در طبقه کربناته که در قیاس با رخسارهای استاندارد [۹]، نمایش داده شده‌اند. چنان‌طور که مشاهده می‌شود تنوع رخسارهای این دنباله بسیار پایین بوده و در کل رخسارهای نواحی نسبتاً عمیق اقیانوسی را نشان می‌دهند.



شکل ۶ مدل محیط تهنشستی کربناتهای کرتاسه در جنوب و شرقی شهریززاد. حروف لاتین، در تصویر، رخسارهای را نشان می‌دهد که در متن شرح داده شده‌اند [۴] با تغییرات.

میزان در هر سه کانسار با آلیزارین سرخ و فروسیانید پتابسیم رنگ آمیزی و بررسی شدند (شکل ۷). رنگ آمیزی و بررسی تمامی مقاطع ارم کوچک، ارم بزرگ و آساران نشان داده است که سنگ میزان این کانسارها تماماً کلسیتی بوده و در اثر واکنش با آلیزارین، رنگ سرخ به خود گرفته‌اند (شکل ۷).

۱۱ نمونه به روش پراش پرتو ایکس (XRD)، از برش ارم کوچک، مورد بررسی قرار گرفتند. پراش نگاری‌ها و داده‌های تجزیه عنصری در راستای این برش هیچ آثاری از دولومیت شدن را نشان نمی‌دهند. مقدار منیزیم نیز بسیار پایین است و این مقدار پایین منیزیم ناشی از کانی‌شناسی اولیه سنگ میزان است (شکل ۸).


دولومیتی شدن

دولومیت گرمابی در بیشتر کانسارهای با سنگ میزان کربناته به صورت جانشینی سنگ میزان کربناته، سیمان بین ذرات و پرکننده‌ی فضاهای خالی مشاهده می‌شود. این دولومیت ممکن است پیش، همزمان و یا پس از مرحله‌ی اصلی کانه‌زایی ایجاد شود که معمولاً با مقدادر بسیار کمی سولفید همراه است. دولومیت گرمابی در این تیپ از کانسارها ممکن است تا کیلومترها دورتر از توده‌ی معدنی و در سنگ آهک‌های فقیر از ماده‌ی معدنی گسترش پیدا کند [۱۲].

در این بررسی و به منظور شناسایی دولومیت در سنگ میزان کانسارهای مورد بررسی، مقاطع نازک مختلف سنگ



شکل ۷ در نیمه رنگ آمیزی شده‌ی این مقطع میکروسکوپی تمامی بلورها به رنگ سرخ در آمده‌اند که معرف کلسیتی بودن سنگ میزان است (نمونه ۶۱ از کانسار ارم کوچک، نور عادی).



شکل ۸ مقایسه‌ی پراش نگاشتها و MgO و SiO_2 در برش ارم کوچک. در راستای این برش، پراش نگاشتها تغییرات بسیار کمی را نشان می‌دهند، و بیانگر نبود دولومیت در دنباله‌ی مورد بررسی است. همچنین نتایج تجزیه‌های عنصری در راستای این برش، تایید کننده نبود دگرسانی‌های دولومیتی و سیلیسی است.

ژئوشیمی عنصری

تغییرات عناصر فرعی موجود در کربنات‌ها (Sr, Na, Mn, Fe)، در راستای دو برش آساران و ارم کوچک در شکل ۹ نشان داده شده‌اند. چنانکه در این شکل دیده می‌شود، کاهش نسبی در مقدار منگنز و آهن با فاصله گرفتن از رگه‌های کلسیتی حاوی ماده‌ی معنی مشاهده می‌شود، در حالی که مقدار استرانسیم و سدیم افزایش نسبی از خود نشان می‌دهند. همچنین بررسی همبستگی این عناصر در مقایسه با بررسی‌های [۱۶]، بیانگر تأثیرات بسیار اندک فرآیندهای دیاژنتیکی بر


در در گستره‌ی کانسار آساران نیز مشابه کانسار ارم کوچک، درصد منیزیم در نتایج تجزیه‌های عنصری بسیار پایین است و بررسی‌های میکروسکوپی و تجزیه‌های شیمیایی سنگ بستر این کانسار آثاری از دولومیتی شدن را نشان نمی‌دهد. در سنگ آهک‌های کرتاسه جنوب شرقی شهرمیرزاد، ۶ نوع بافت دولومیتی تشخیص داده شده‌اند و می‌توان این دولومیتی شدن را در ارتباط با تأثیر آبهای جوی و یا فرآیندهای کارست‌زایی پس از ته نشستی و نیز فعالیت‌های گرمابی دوره‌ی سنوزوئیک وابسته دانست [۲].

مقدار سرب و روی مشاهده شده در سنگ آهک میزبان کانه‌زایی در این کانسارها نیز بسیار کمتر از مقداری است که توانایی ایجاد کانسار را داشته باشد و یا به عنوان بخشی از خاستگاه احتمالی تأمین کننده‌ی فلز این کانسارها در نظر گرفته شود.



در گستره‌ی کانسارهای جنوب و شرق شهری‌زاد، میانگین حد زمینه‌ی سرب ppm ۱۳۲، روی ppm ۹۸ است و خاستگاه سرب و روی در این ناحیه درون حوضه‌ای عنوان شده است[۶].

پراکندگی این عناصر در بستر کربناتی کانسارهای یاد شده است (شکل ۱۰).


پراکندگی عناصری که در کانسارهای سرب و روی متأثر از فرآیندهای کانه‌سازی هستند نیز نشان می‌دهد که این عناصر در کانسارهای آساران و ارم کوچک نسبت به زون کانه‌دار تغییرات اندکی دارند و در اکثر موارد مقدار آن‌ها با فاصله گرفتن از رگه‌های حاوی ماده معدنی در این کانسارها به‌طور نسبی کاهش می‌یابد (شکل ۱۱ و ۱۲).




شکل ۹ تغییرات عناصر اصلی نسبت به زون کانه‌دار در برش‌های آساران و ارم کوچک. افزایش نسبی مقدار سدیم و استرانسیم و کاهش نسبی مقدار آهن و منگنز نسبت به زون کانه‌دار در این شکل دیده می‌شود.



شکل ۱۰ بررسی نسبت عناصر فرعی در بستر کربناتی کانسارهای آساران و ارم کوچک. عدم حضور ارتباط واضح بین روند تغییرات عناصر در این کربنات‌ها بیانگر تاثیر بسیار پایین دیاژنر بر این دنباله است.



شکل ۱۱ نیمرخ ژئوشیمیایی سنگ میزبان کانسار ارم کوچک. روند تغییرات عناصر روی، باریم، ارسنیک، کادمیم و جیوه مشابه است و در زون کانه‌دار افزایش نشان می‌دهد. همچنین یک روند کاهشی نیز در مقادیر سرب، مس، نیکل، آنتیموان و اورانیوم مشاهده می‌شود.



شکل ۱۲ نیمرخ ژئوشیمیایی کانسار آساران. در این شکل مشاهده می‌شود که روند تغییرات ژئوشیمیایی غیر از کادمیم و جیوه برای دیگر عناصر، به سمت بخش‌های بالایی این برش، و با فاصله گرفتن از زون کانه‌دار، کاهش نسبی را نشان می‌دهد.

سانتی‌گراد محاسبه شده است (شکل ۱۴) که با داده‌های به-

دست آمده از معادلات تعیین دما همخوانی دارد.

با توجه به اینکه ترکیب ایزوتوب کربن کلسیت رگه‌های معدنی مشابه با سنگ میزبان کانسارهای آساران، ارم کوچک و ارم بزرگ و آهک‌های کرتاسه است، خاستگاه منشأ احتمالی این کلسیتها را سنگ میزبان در نظر گرفتیم و در نتیجه دمای ۶۰ تا ۸۰ درجه سانتی‌گراد برای این کلسیتها به دست آمد (شکل ۱۴).

با توجه با تأثیر بسیار کم دیاژنز بر این دنباله‌ی کربناته، این کاهش در $\delta^{18}\text{O}$ را می‌توان ناشی از افزایش دمای این کلسیتها دانست که احتمالاً به دلیل نفوذ شاره‌های کانه‌زا ایجاد شده است. همچنین روند تغییرات ایزوتوب‌های پایدار کربن و اکسیژن با هیچ یک از روندهای دیاژنتیکی همخوانی ندارد.

ژئوشیمی ایزوتوبی

ایزوتوب‌های اکسیژن سنگ میزبان (جدول ۱، موقعیت نمونه‌ها در طول ستون چینه‌شناسی شکل‌های ۱۱ و ۱۲ مشخص شده است) کانسارهای آساران و ارم کوچک نسبت به کلسیت‌های دریایی کرتاسه کاهش نسبی نشان می‌دهند. در حالی که ترکیب ایزوتوبی کربن در مقایسه با کلسیت‌های همزمان، تغییرات بسیار اندکی را نشان می‌دهد (شکل ۱۳) و تاییدی بر تأثیر کم شاره‌های جوی بر این دنباله است. [۱۰] به استفاده از معادلات تعیین دما به یاری داده‌های ایزوتوبی اکسیژن، نموداری را طراحی کردہ‌ایم که در این نمودار دمای دریایی کرتاسه ۱۰ تا ۱۵ درجه سانتی‌گراد را نشان داده است. با استفاده از این نمودار در دنباله‌ی کرتاسه جنوب چاشم نیز دمای سنگ‌های کرتاسه میزبان کانسارهای سرب و روی ۲۹ تا ۳۰ درجه

کانه‌زایی، می‌تواند بیانگر ارتباط ژنتیکی یکسان بین این دو مجموعه هنگام کانی‌سازی درونزاد باشد.

تجزیه ژئوشیمیایی نمونه‌های برداشت شده از دو برش آسaran و Arم کوچک نیز نشان داد که تغییرات سدیم، استرانسیوم، منیزیم و آهن در کربنات‌های میزبان کانه‌زایی هیچگونه روند دیاژنتیکی را نشان نمی‌دهند و پراکندگی آن‌ها به طور نسبی تحت تأثیر فرایند کانه‌سازی بوده است. پراکندگی سرب، روی، باریم، مس، نیکل، ارسنیک، کادمیم، آنتیموان، جیوه و اورانیوم، در بستر کربناتی نیز بسیار کم بوده و با فاصله گرفتن از کانسار مقدار این عناصر کاهش بسیار اندکی نشان می‌دهد. تغییرات ایزوتوپ‌های پایدار دنباله‌ی کرتاسه شمال غرب شهمیرزاد نیز نمایشگر این است، که احتمالاً مهم‌ترین عاملی که بر ترکیب ایزوتوپی سنگ میزبان تأثیر گذار بوده افزایش دمای ناشی از کانه‌سازی رگه‌های گرمابی بوده و فرآیندهای دیاژنتیکی و دیگر فرایندها نقش کمی در تغییرات ترکیب ایزوتوپی بستر کربناتی کانسارهای مورد بررسی داشته‌اند.


بحث و برداشت

بررسی مقاطع نازک و صیقلی و نیز نمونه‌های دستی نشان داد که تنها کانی گالن، کانه اصلی و درونزاد در کانسارهای شمال شهمیرزاد است و اسفالریت و پیریت در مقادیر بسیار اندک دیده می‌شود. در کانسارهای جنوب و شرق شهمیرزاد نیز کانه‌ای درونزاد اصلی گالن بوده و اسفالریت، پیریت و کائولن در مقادیر کمتر دیده می‌شوند و کانه‌زایی اولیه در هر دو مجموعه کانسارها در کنترل گسل‌های با راستای شمال غربی-جنوب شرقی است.


کانی برونزاد اصلی در کانسارهای شمال شهمیرزاد سروزیت است که در درز و شکاف‌های کارستی به صورت بلورهای تیغه‌ای دیده می‌شود. در حالی که در کانسارهای جنوب و شرق شهمیرزاد مقدار و نوع کانی‌های برونزاد نسبت به کانسارهای شمال شهمیرزاد بیشتر است. شواهد سن نسبی، کانی‌شناسی بسیار ساده و مشابه در کانه‌های درونزاد و نیز پیدایش کانه‌ها در گسل‌های با راستای تقریباً یکسان در هر دو مجموعه در گسل‌های با راستای تقریباً یکسان در هر دو مجموعه

جدول ۱ نتایج تجزیه‌های ایزوتوپی کربن و اکسیژن سنگ میزبان در کانسارهای آسaran و Arم کوچک.

	meter	$\delta^{13}\text{C}$ (PDB)	$\delta^{18}\text{O}$ (PDB)
Ar 61	0	-4.13	2.69
Ar 72	90	-4.99	2.59
Ar 77	190	-2.88	3.89
As 51	32	-4.37	2.21
As 54	137	-3.3	2.34
As 56	208		
As59	235	-3.8	1.78



شکل ۱۳ مقایسه‌ی مقادیر $\delta^{18}\text{O}$ و $\delta^{13}\text{C}$ کرتاسه فوکانی میزبان کانسارهای آسaran و Arم کوچک با ترکیب ایزوتوپی کلسیت‌های کرتاسه فوکانی رسم شده در شکل بر گرفته از بررسی‌های [۱۰]. چنانکه شکل نشان می‌دهد تغییرات $\delta^{13}\text{C}$ میزبان کربناتی کانسارهای مورد بررسی نسبت به کلسیت‌های هم‌مان بسیار ناچیز است که بیانگر تأثیر اندک شاره‌های جوی بر این دنباله است.



شکل ۱۴ تعیین دمای میزبان کربناتی و رگه‌های کلسیتی دارای ماده‌ی معدنی با استفاده از نمودار ارائه شده توسط [۱۰]. چنانکه مشاهده می‌شود، دمای میزبان کربناتی کانسارهای مورد بررسی (۲۸-۳۲ درجه سانتی‌گراد)، تحت تاثیر نفوذ رگه‌های گرمابی (با دمای ۶۰-۸۰ درجه سانتی‌گراد) قرار گرفته و در حدود ۱۵ درجه سانتی‌گراد بالاتر از میانگین کلسیت‌های تهنشین شده از آب دریایی کرتاسه است.

دولومیتی دیده نمی‌شود. عدم وجود رخساره‌ی مناسب و نفوذپذیر و نیز نبودن دولومیت در سنگ میزبان سبب جلوگیری از چرخش شاره‌های ثانویه درون این دنباله‌ی کربناتی شده و کانه سازی درونزad به همان صورت اولیه باقی مانده و کانی‌سازی بروزنزad بسیار کم شکل گرفته است. همچنین به دلیل عدم نفوذپذیری سنگ میزبان این کانسارها، پراکندگی سرب و روی و عناصر همراه فقط با زون‌های کانه‌دار در این ناحیه کنترل شده است.

در حالی‌که وجود رخساره‌های نفوذپذیر وابسته به نواحی کم عمق در دنباله‌ی کرتاسه جنوب و شرق شهمیرزاد سبب شد که پس از کانه‌سازی درونزad، شاره‌های جوی و دیگر شاره‌ها، توانایی چرخش در این واحد نفوذپذیر را داشته باشند و از این رو چرخش این شاره‌ها سبب توزیع و تمرکز دوباره‌ی فلزات درونزad در میزبان کربناتی شوند. بالا بودن مقدار کانه‌های

در جنوب و شرق شهمیرزاد تغییرات عناصر فرعی کربنات‌های کرتاسه نشانده‌ندی تأثیر دیابتز ناشی از شاره‌های جوی بر این دنباله است. علاوه بر این تغییرات در این ناحیه، فرایندهای زیستی، فشرده‌گی، انحلال، سیمانی شدن و نوشکلی نیز مشاهده شده است [۴]. همچنین بررسی تغییرات عناصر متأثر از کانه‌سازی سرب و روی در این ناحیه نشان داد که از عوامل مؤثر در پراکندگی این عناصر، تغییرات رخساره‌ای و وجود رخساره‌های نفوذ پذیر در این ناحیه بوده است [۵].

بررسی رخساره‌های میزبان سه کانسار آسaran، ارم کوچک و ارم بزرگ، نشان دادند که شرایط و محیط رسوبی حاکم در زمان رسوبی این دنباله‌ی کربناتی، بخش‌های نیمه عمیق تا عمیق حوضه‌ی رسوبی بوده است. در چنین محیطی مقدار میکراتیت تهنشست‌های بالا بوده و زمینه سنگ‌ها را ایجاد کرده است و وجود میکراتیت فراوان نفوذپذیری سنگ‌ها را کاهش داده است. همچنین در گستره‌ی این سه کانسار هیچ نوع

اسرافیلی دیزجی و جواد ربانی به دلیل ارائه نقطه نظرهای علمی در زمینه‌ی بررسی‌های رسوب‌شناسی قدردانی می‌شود.

مراجع

- [۱] آدابی م. ح., "رونده تغییرات ژئوشیمیایی در سنگ‌های کربناته نزدیک به کانسار قلع", مجله بلورشناسی و کانی‌شناسی ایران, سال پنجم, شماره ۲, ۱۳۷۶ تا ۹۷.
- [۲] بازرگانی گیلانی ک., فرامرزی م. الف, "ژئومتری، پتروگرافی و ترکیب دولومیت کرتاسه شهمیرزاد، البرز مرکزی", بیست چهارمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور ۱۳۸۴.
- [۳] بازرگانی گیلانی ک., فرامرزی م. ب, "زمین‌شناسی و ژنز کانسارهای سرب و روی شمال سمنان", بیست چهارمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور ۱۳۸۴.
- [۴] بازرگانی گیلانی ک., فرامرزی م., "رخسارهای، محیط رسوی و کانی‌شناسی کربناتهای اولیه توالی کرتاسه کوه بشم، جنوب البرز مرکزی", مجله بلورشناسی و کانی‌شناسی ایران، شماره ۱، ۹۱ تا ۱۱۶.
- [۵] فرامرزی م., "زمین‌شناسی و ژنز کانسارهای سرب و روی با بستر کربناته، دریند-کوه بشم، شمال سمنان، البرز مرکزی", پایان‌نامه کارشناسی، ارشد دانشگاه تهران، دانشکده زمین‌شناسی، ۱۳۸۵، ۱۸۲ صفحه.
- [۶] مددی م، رسا ا، "مطالعه مکانیسم تهذیب سولفیدی و ارائه مدل ژنتیکی کانسار سرب رضا آباد", بیست ششمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور ۱۳۸۶.
- [7] Allen M. B., Ghassemi M. R., Shahrabi M., Qorashi M., "Accommodation of late Cenozoic oblique shortening in the Alborz range, northern Iran", J. Structural Geology, 25, 2003, 659–672.
- [8] Degi S., "Sedimentary facies, paleogeography, and the formation of mineral deposits in the Middle and Late Devonian", South China, Mineral. Deposita, 23, 1988, 77-85.
- [9] Flugel E., "Microfacies of carbonate rocks, analysis", interpretation and application. Springer-verlag, Berlin. 2004, 976.

برونزاد در کانسارهای جنوب و شرق شهمیرزاد نیز مؤید این مسئله است.

مشابه این فرآیند نیز الیور [۱۴] در ارتباط با کانسارهای اورانیوم گونه‌ی ناپیوستگی و نیز کانسارهای IOCG نیز گزارش کرده است.

برداشت

با توجه به شباهت‌های کانی‌شناسی معدنی و ساختاری کانسارهای شمال غربی (مجموعه کانساری ارم) و جنوب و شرقی شهمیرزاد (مجموعه کانساری شهمیرزاد)، می‌توان خاستگاه مشترکی را برای این دو روند کانه‌زایی در نظر گرفت. با وجود بر این مقایسه‌ی سنگ‌های میزبان کربناتی این دو مجموعه‌ی کانه‌زایی نشان داد که تأثیر کنترل کننده‌های لیتولوژیکی (میزبان کربناته) بر کانسازی کانسارهای ارم بزرگ، ارم کوچک و آساران در شمال غرب شهمیرزاد بسیار ناچیز بوده و تاحدود زیادی از چرخش شاره‌های درون سنگ میزبان جلوگیری کرده است. این امر سبب شد تا سرب و روی و عناصر دیگر همراه در بستر این کانسارها پراکندگی بسیار ضعیفی داشته باشند و کانه سازی بروندزاد بسیار کم شکل گیرد. در حالی که در کانسارهای جنوب و شرق شهمیرزاد، شاره‌های دیاژنزی سبب تحرک مواد معدنی در سنگ میزبان کربناتی شده و علاوه بر افزایش قابل توجه سرب و روی در بستر کربناتی، کانه‌زایی بروندزاد گستردگی را ایجاد کرده است. چرخش این شاره‌ها بیشتر با رخساره‌های نفوذپذیر و بخش‌های دولومیتی شده در این ناحیه کنترل می‌شده است. مقایسه‌ی این دو مجموعه نشان می‌دهد که کانه‌سازی درونزاد در این ناحیه با فرایندهای دیرزاد صورت گرفته و کنترل کننده‌های ساختاری نقش اساسی در شکل‌گیری این کانسارها داشته‌اند. بستر کربناته نیز فقط در ایجاد فرایندهای بروندزاد به ویژه در مجموعه کانسارهای جنوب و شرق شهمیرزاد موثر بوده است.

قدرتانی

از جناب آقای دکتر جهانبخش دانشیان برای تعیین سن نسبی، تشخیص محتوای فسیلی و شناسایی محیط رسوی دنباله‌ی مورد بررسی، تشکر و قدردانی می‌شود. همچنین از آقایان بهروز

- Interfaces during Basin-Related Mineralization, 100th Anniversary Special Paper”, Vol.101, January–February, No. 1, 2006, pp. 1–31.*
- [15] Vandeginste V., Swennen R., Gleeson S. A., Ellam R. M., Osadetz K., Francois R., “Geochemical constraints on the origin of the Kiking Horse and Monarch Mississippi Valley-type lead-zinc ore deposits”, southeast British Columbia, Canada, Mineralium Deposita, 42, 2007, 913-935.
- [16] Winefield P. R., Nelson C. S., Hodder A. P. W., “Discriminating temperate carbonates and their diagenetic environments using bulk elemental geochemistry: a reconnaissance study based on New Zealand Cenozoic Limestone”, Carbonates and Evaporites, v. 11, 1996, p. 19-31.
- [17] Wilson J. L., “Carbonate facies in geological history”, Springer-Verlag, New York 1975 (471).
- [18] Zanchi A., Berra F., Mattei M., Ghassemi M. R., Sabouri J., “Inversion tectonics in central Alborz, Iran”, Journal of Structural Geology, 2006, p. 1-15.
- [10] Kirmaci M. Z., Akdag K., “Origine of dolomite in late Cretaceous-Paleocene Limestone turbidites, Eastern Pontides, Turkey”, Sedimentary Geology, 181, 2005, 39-57.
- [11] Leach D. L., Sangster D. F., “Mississippi Valley-type Lead-Zinc Deposits, Mineral Deposit Modeling: Geological Association of Canada”, Special Paper 40, 1993, p. 289-314.
- [12] Leach D. L., Sangster D. F., Kelley K. D., Large R. S., Garven G., Allen C. R., Gutzmer J., Walters S., “Sediment-Hosted Lead-Zinc Deposits: A Global Perspective”, Economic Geology, 2005, p. 561-607.
- [13] Martin J. M., Torres-Ruiz J., Fontbot L., “Facies control of strata-bound ore deposits in carbonate rocks: The F-(Pb-Zn) deposits in the Alpine Triassic of the Alpujarrides”, southern Spain Mineral. Deposita 22, 1987, 216-226
- [14] Oliver N. H. S., Mclellan J. G., Hobbs B. E., Cleverley J. S., Ord A., Feltrin L., “Numerical Models of Extensional Deformation, Heat Transfer, and Fluid Flow across Basement Cover